

12
16
f
20





GABRIELIS

FALLOPPII

MVTINENSIS MEDICI

NOSTRA TEMPESTATE

CLARISSIMI,

Opuscula Tria.

I. Tractatus de Vulneribus.

II. Expositio in lib. Hipp. de Vulneribus capitis.

III. Tractatus de Vulneribus oculorum, aliarumque partium corporis.

Quibus accessere Indices duo: prior Capitulorum, altero rerum
& verborum maximè insignium.

CVM PRIVILEGIO.



VENETIIS, apud Paulum Meietum & Fratrem,
M. D. L X I X.

GABRIELIS

PAULI

INSTITUTUM

NOTITIA

CLAUSTRUM

Quintus

II. Tabula de V. m. m.
II. Tabula de V. m. m.
III. Tabula de V. m. m.
IV. Tabula de V. m. m.

Tabula de V. m. m.
Tabula de V. m. m.

CVM PRIVILEGIO



Tabula de V. m. m.
M. D. LXX.



EXCELENTISS.
ATQVE DOCTISS.

MEDICO,

D. IOANNI ANDREAE

à Cruce Veneto,

Paulus Meietus bibliopola Patauinus, S.



VM eram proximis diebus, Venetijs, cùm librum de Chirurgia à te inscriptum; nunc sub prælo, propediem autem opera D. Iordani Zileti viri integerimi (qui quantum tibi tribuat, quamq; de te præclarè sentiat, tu optimus es ipse testis) edendum uidissem, varijsq; , ac propemodū infinitis figuris exornatum; non potui summoperè non admirari uirtutem tuam; quæ profectò non humili neque obscuro loco latebit, sed quasi in specula quadam excelsa atque illustri erit posita, vnde & omnis posteritas

longè meliùs (vt oēs vno ore fatētur) quàm ante-
hac (pace Medicorū oīum tūm veterū, tūm recen-
tiorū, vel methodicorū, vel practiciantū dixerim)
poterit adiuuare. Cū itaq; ego verè perspiciam,
quantū iudicio assequi possum, homines ad te ac-
currere debere, vel vt cōsiliū, vel ēt vt auxilium
petant; idq; mihi sēp enūmerō memoria repetēti,
ex officina nostra publicaturo Gabrielis Fallop-
pij viri nostra tēpestate de re medica benè meriti,
Tractatū de Vulnerib. atq; expositionem in librū
Hipp. de Vulneribus Capitis, nec non tractatū il-
lum, quē ipse nuper de Vulneribus Oculorum, &
aliarū partiū corporis, nunquā tamen antea ab vl-
lo (quod sciā) editum, inscribi voluit; tu in primis
occurristi, cuius nomini libelli isti propter tāti vi-
ri auctoritatē, quē semper plurimi fecisti, dicandi
forent: vt, vel summā animi mei in te obseruatiam
ob tuas eximias virtutes, singularēq; humanitatē
tibi significarēt; vel ēt, quoniā congruū mihi visū
est, hosce sub illius nomine in lucē edēdos, qui in
huiusmodi facultate principē locū faciliē obtine-
re videretur. Accipe igitur, Excell. atq; vnde quaq;
doctiss. Io. Andreas, hoc quicquid est munusculi;
& eo, quo soles, amore, lētoq; animo cōplectaris,
atq; in cliētelam tuā suscipias; illiusq; exiguitatē
animi beneuoli, gloriæq; tuę studiosi affectu com-
penses. Vale. Patauij, ex officina nostra, 1569.

CAPITVM QVAE IN PRIMO LIBRO CONTINENTVR INDEX.

P RAEFATIO, in qua tangitur artis huius nobilitas.	c. 1. pag. 1
De uarijs scriptoribus, & quos sequi debemus.	cap. 2. 3.
De uulneris definitione.	cap. 3. 4
An solutio unitatis sit morbus partium similarium necne?	cap. 4. 5
Defenditur Gal. & alij.	cap. 5. 7
Species solutae unitatis ex Concil.	c. 6. ib.
Declarat dictas species à Gal. propositas & defendit Gal.	c. 7. 8
De speciebus solutae unitatis ex inuentione propria.	cap. 8. 9
De uulneris definitione completa.	c. 9. 12
De uulneris speciebus & differentijs.	cap. 10. 13
De causis & signis uulnerum.	c. 11. 14
De praesagio.	c. 12. 15
De ordine in curatione uulnerum seruando.	c. 13. 19
De simplici uulnere ac duplici unione, per agglutinationem scilicet, ac per colligationem.	c. 14. 20
De ijs, quae curantur per agglutinationem.	c. 15. 21
De causis agentibus.	c. 16. 23
De impediētibz naturam.	c. 17. 24
Quomodo in uulneribus sanguis est suppressendus.	c. 18. 25.
Quod relinquenda uia uulneri, ex qua id, quod retinetur effluat.	c. 19. 26
Quid pus, quid ichor, quid sordes.	c. 20. 27
De excrementorum in uulneribus materia & causis.	c. 21. 29
De extractione sagittarum, & telorum in uulneribus infixorum.	c. 22. 31
De medicamentis extrahentibus compositis.	c. 23. 34
De extractione spiculorum, & aliorum per instrumenta, & quae sunt obseruanda in extractione.	c. 24. 36
Quaestio de tempore extractionis teli à uulneribus.	c. 25. 37
Quaestio an sint integra spicula extrahenda.	c. 26. 39
Quaestio an per eandem uiam extrahenda spicula.	c. 27. 39
An recta an transversa uia educenda spicula.	c. 28. 39
Quo instrumento educenda sunt tela ex uulneribus.	c. 29. 40
De unione. c. 30. 42.	De deligatione.
De utilitate fasciarum. c. 32. 45.	De deligatione incarnatiua.
De deligatione retentiua.	c. 33. 46
De deligatione expulsiua.	c. 34. 46
De deligatione prohibente apostema.	c. 35. 46
Quid debet obseruari in deligatione.	c. 36. 47
De plumaceolis.	c. 37. 47
	c. 38. 48
	De

De laqueationibus.	c.39. <i>ibid.</i>
De futuris.	c.40. 50
De usu suturarum.	c.41. 53
De materia in futuris deligenda, & primò de acu.	c.42. 54
De fistula argentea.	c.43. <i>ib.</i>
De filo.	c.44. 55
Documenta circa futuras.	c.45. 56
Partis temperiem seruandam	c.46. 57
Quomodo inueniuntur medicamenta conseruantia siccitatem.	c.47. 58
De alio usu medicamentorum siccantium.	c.48. 59
Aqua frigida, oleū, linæola pura benedicta & albū oui improbat̃ur.	c.49. 61
De medicamentis agglutinantibus oportunis.	c.50. 63
De compositis medicamentis agglutinantibus.	c.51. 64
De modo applicandi medicamenta.	c.52. 67
An mittendus sanguis.	c.53. <i>ib.</i>
Occasiones, quæ indicant secandam uenam.	c.54. 69
De medicamento purgante.	c.55. 70
Qua sint uulnera, in quibus purgatio necessaria.	c.56. 71
De preparatione humorum.	c.57. <i>ib.</i>
De ratione uictus, & primò de cibo, & potu.	c.58. <i>ib.</i>
De motu, & quiete.	c.59. 72
De somno, & uigilia.	c.60. 73
De ambiente.	c.61. 73
De animi passionibus.	c.62. 75
De ijs, qui potionibus tentant agglutinationem.	c.63. <i>ib.</i>
Quando agglutinare non possumus tentamus secundum scopum.	c.64. 76
De modo sistendi sanguinem.	c.65. 77
De linamentis.	c.68. <i>ib.</i>
De medicamentis forcoricis simplicibus.	c.67. 79
De sarcoticis compositis.	c.68. 82
Quid imponendum supra splenia replentia uulnus.	c.69. 83
De carne supercrescente uulneribus.	c.70. 84
De cicatrice.	c.71. 85
De medicamentis epuloticis.	c.72. 86
De symptomatibus uulneribus superuenientibus.	c.73. 88
De dolore mitigando in uulneribus.	c.74. 91
De inflammatione.	c.75. 92
De erisipelate.	c.76. <i>ib.</i>
De intemperiebus.	c.77. 93
De œdemate, & sanguinis fluxu.	c.78. <i>ib.</i>
Epilogus omnium hactenus dictorum.	c.79. <i>ibid.</i>

CAPITVM SECVNDI LIBRI INDEX.

P RAEFATIO, in qua genus Hip. atq; intentio proponitur. c. 1. p. 101	
Scopus, subiectum, utilitas.	c. 2. pag. 104.
Ordo, & an liber medicus sit, an practicus, & titulus.	c. 3. 105
De ordine & diuisione rerum tractandarum.	c. 4. ib.
De capitum varietate. c. 5. 106	De natura ossis caluaria. c. 6. 109
De robore, & imbecillitate ossium.	c. 7. 112
Dubitatio an vulnera sincipitis magis lethalia, temporum vulneribus & an cerebri sentiat.	c. 8. 114
De imbecillitate ossium temporum. c. 9. 116	De ossibus verticis. c. 10. 118
Respondetur obiectioni circa superius explicata.	c. 11. 121
De iurvis ossium capitis. c. 12. ib.	De fracturarum speciebus. c. 13. 123
Quaestio an percussa una parte cranei, contrahatur rima in altera, & opposita.	c. 14. 129
De ordine seruato ab Hipp. in tradenda curatione.	c. 15. 133
Curatio ossis fracti, & indicationes eius	c. 16. ibid.
Quid agendum circa apertionem in fracturis ossium pro fracturarum diuersitate ex Hipp.	c. 17. 135
De signis ossis denudati, & fracti, atque quo fracturae genere.	c. 18. 136
De signis fracturarum. c. 19. 142	De ordine in curatione seruando. c. 20. 144
De curatione vulneris simplicis quando os detectum non est.	c. 21. 145
De curatione vulneris osse detecto.	c. 22. 146
Experimenta quibus cognoscimus an os fractum sit.	c. 23. 148
De prognostico osse fracto existente.	c. 24. 150
De curatione, & primo de ratione vitii.	c. 25. 151
An debeamus secare venam. c. 26. 153	De pharmaco exhibendo. c. 27. ibid.
De curatione vulneris cum osse fracto circa locum affectum, & declarat quam sectam sit sequenturus.	c. 28. 155.
De sectione pericranei. c. 29. 156	De dilatatione vulneris. c. 30. 157
Quid agendum post optimam vulneris detectionem, quando aperiendum os ex sententia aliorum.	c. 31. 158
Sententia propria quando aperiendum os, & quando non.	c. 32. 160
Quid agendum in deratione ossis.	c. 33. 161
Quando fracta est secunda lamina quid agendum.	c. 34. 162
De loco detegendo quantum ossis auferendum.	c. 35. ibid.
Modus auferendi ossa, & de instrumentis.	c. 36. 164
De ratione curandi vulnera capitis, in quibus membrana nihil passa est. c. 37. 167	
De siccanti ratione, qua vti possumus in membranis cerebri.	c. 38. 169
De lenienti ratione, qua vtitur in cerebri membranis.	c. 39. ib.
Fracto osse, detecta membrana, exiccata, & lenita quid agendum circa reliquum vulnus.	c. 40. 170
	Quid

INDEX.

Quid agendum denigrata existente membrana,	c.41.171
Ad membranam inflammata.	c.42.172
Ad membranæ abscissum.	c.43.1b.
Quid agendum membrana vulnerata & fluente sanguinis copia.	c.44.1b.
De vulnerato cerebro.	c.45.173
Quando os fractum est, integra adhuc cuti, an aperiendum.	c.46.174
Fracto osse, integra cuti existente. curatio.	c.47.177
Signa indicantia mortem in vulneribus.	c.48.178
Curatio convulsions, & causa quare pars affecta resoluitur, opposita conu-	c.49.1b. d
litur.	

CAPITVM TERTII LIBRI INDEX.

D E difficultate sanationis vulnerum oculorum.	c.1. pag. 148
De speciebus vulnerum oculorum.	c.2.184
De vulneribus palpebrarum.	c.3.1b. d.
De vulneribus circa oculum, & partes inferiores.	c.4.186
De bulbo vulnerato. c.5.187. De dolore oculi.	c.6.191
De cicatrice obducenda.	c.7.192
De vulneribus narium.	c.8.193
De auricularum vulneribus.	c.9.195
De vulneribus colli.	c.10.1b. d.
De simplici vulnere colli.	c.11.1b. d.
De vulneribus gula, & aspera arteria.	c.12.197
De vulneribus uasorum colli.	c.13.198
De vulneribus spinalis medulla.	c.14.205
De vulneribus thoracis.	c.15.206
De signis, quibus cognoscimus vulnera thoracis intro penetrare.	c.16.207
In vulneribus thoracis intaetis uisceribus an consuendum, & curatio	c.17.209
De vulnere pulmonis.	c.18.213
De vulneribus abdominis & signis.	c.19.214
De præsagijs vulnerum abdominis.	c.20.215
De curatione vulnerum abdominis illaſis partibus internis.	c.21.216
De vulnere omenti.	c.22.217
De vulneribus intestinorum.	c.23.1b. d.
De vulnere ventriculi.	c.24.219
De hepatis vulneribus.	c.25.1b. d.
De renum vulneribus.	c.26.200
De vulnere uesicæ.	c.27.1b. d.
De vulneribus neruorum.	c.28.1b. d.



GABRIELIS FALLOPPII
M V T I N E N S I S
MEDICI CLARISSIMI,
TRACTATVS

De Vulneribus.

Prefatio in qua tangitur artis huius nobilitas.

Cap. I.



EDICINAM (Auditores optimi) nobilissimum Deorum inuentum esse, tota testatur antiquitas, atque ad Apollinem referri, cuius in ore, Poetae isthæc verba concinnant, Inuentum Medicina meum &c. hæc vna, & eadem ars est, & semper fuit: Medici omnes in vnum scopum nervos intenderunt, ut hominum, scilicet sanitatem tueantur, deperditam recuperando, præsentem conseruando. Verum cum non vna materia, neque vna sit methodus, qua artem addiscamus; ideo in plures formas uisum est uariari, & plures sortita est partes. Cæterum cum multi Medici didicerint, atque simul fecerint, usu euenit, ut medicinam aliqua ex parte rationi subditam, aliqua ex parte empiricam, id est manibus, pharmacis varijs temporum occasionibus inuenerint. Vltimò cum duo sint potissimum morborum genera, quibus corpus patitur; alterum extrinsecus adueniens, quod causas extra corporis compages habet, in hoc genere fractiones, & vulnera continentur. alterum intrinsecus, quod causas intra corpus habet, ueluti febres,

A vlcerâ,

ulcera, tumores præter naturam. Ad sananda hæc varieg species or-
ta sunt Medicorum. Aliqua ars uulneraria dicitur, qua uulnera san-
antur tantum. hos autem, qui morbos curant intimos Physicos ap-
pellare solent, sed reuera & qui uulnera sanant Physici nomen me-
rentur: ideo male sunt soli illi Physici dicti. Cum ergo uulnorum cu-
randorum artem uos hoc anno docturus sim, non possum contineri
quin uos horter, ut in ipsa exerceamini, ad hocque ducet uos artis
præstantia, mihi enim uidetur inter omnes Medicinæ partes primum
sibi locum uindicasse. & ideo qui hominum uulnera curat, potest
princeps Medicorum appellari, quod difficile non uidetur, ut probem
cum multæ sint rationes. & primò. Genus humanum integrum uiue-
re non potest desinente ista; uideo multos morbos sine arte medi-
ca sanari, nullum uulnus alicuius momenti absq; Medico curatur. fe-
bres, tumores, ulcera, & multa alia ppe spernuntur quandoque medi-
cam. Vocemus testes Rusticos. maior pars eorum laborantium fe-
bre medicos non adit; si feriat, non ipsi tantum, sed bos aut asinus
Medicum continuò accerunt. Vocemus plures nationes; dimitto
Turcas. Addo nobilissimum populum Romanum, qui cum esset
Medicis infestus L. Aemilio, & M. Libio Coss. hanc artem uulnera-
riam non aspernauit, etenim Arcagatus fuit primus qui exercuit Me-
dicinam Romæ. Ant. Gueuara tenet Antonium Musam tempo-
re Cæsaris Augusti fuisse primum Medicum Romæ. Medici au-
tem publicum stipendium erat ducentaquinquaginta sest. ex Glarea
no in lib. de Asse. Secundò pariter artis nobilitatem indicare potest
eius certitudo, & (ut ita dicam) securitas. certa enim & tuta adeò
est, ut raro accidat, quòd uulnerarius imperitia sua homines necet;
omnia namque oculis subiecta habet, digitoque cætera tangit, reliqua
genera morborum præsertim intrinseca ignorantur facile à Medico,
tanquam ab oculorum acie aliena, & ideo circa illa committi po-
test error. Addamus tertio: non est dubium artis illius partem, quæ
captu & tractatu facilior est cæteris nobiliorem esse. ista facillima
est; non etenim multitudine medicamentorum, non simplicium at-
que compositorum mendicata undequeque supellestile in ea indi-
gemus; quàmuis horum pleni sint libri, nam ita paucis gaudet reme-
diis, ut multi limpida aqua sanent uulnera maxima cerebri, membra-
narum, intestinorum, &c. multi etiam puris linteaminibus, nonnulli
uerbis simplicissimis: ex quo artis colligitur securitas, ut purissimis
gaudeat medicamentis, quod facilitatem indicat. Verum cum infi-
nita sint argumenta, quibus præstantiam artis probare possum, om-
nia

nia dimittam, hoc uno excepto. Si antiquitas præstantiam indicat, quid antiquius medicina uulneraria? Consulamus historias, & obseruemus primos Medicos; proculdubio uno excepto Apolline fuit Aesculapius factus Deus, quia homo homini Deus. Aesculapius non febres, non tumores, non uertigines sanauit, sed quia curauit Hippolitum curru uulneratum, & distractum: incolumen fecit Androgeum Minois filium ab Atheniensibus plagis infixum. Præterea ueniamus ad Machaonem filium eius, nonne Homerus eum multis hominibus præponit, quia sapiebat, quia curabat uulnera? Nam Homer. Iliad. *ἄνθρωπος γὰρ ἀνὴρ πολλὸς αὐτὸς εἰσι δ' ἄλλοι, ἰὺ τ' ἠνέμοιοι, ἐν τ' ἤπια φέροι καὶ πᾶσι* id est, Est Medicus unus uir multis anteferendus, Tela excindendi quæ & lenia pharmaca gnarus, Plagæ insig. &c. Descēdamus ad Eribotem primum medicum laudatum ab Orpheo, eod quod uulnerarius Oilei filium sanauit. Cū ergo antiquiores Medicos uulnerarios uideam, colligo partem hanc fuisse satis laudatam, atque præ cæteris partibus celebratam. Cū igitur nobilis sit necessitas, certitudine, facilitate, sinceritate & ratione antiquitatis, cur non erubescunt hi, qui eam dicunt aspernandam esse? Qui hanc floccipendunt indigni sunt Medico nomine. Iam docebo uos rationem, qua uulnera sanetis, ac eam tanto libentiùs aggredior, quanto uobis incredibili emolumento, incomparabili quæ honori futuram censeo.

De uariis scriptoribus, & quos sequi debemus.

Cap. II.



Quamplurimi sunt ueteres scriptores, inter quos primum locum Hippoc. iure obtinet, qui peculiarem scripsit de uulneribus librum, in quo per maiorem partem tradit quæ pertinent ad uulnera: hunc interpretatus est Vidus Vidius Florentinus lector Pisannus, quod libenter ego facerem, si integer esset liber, sed non habemus integrum Hipp. librum, multa enim desunt necessaria. Scripsit Celsus de hac materia, & doctissimè, sed non est proponendus, quoniam miscet uulnera, tumores & fracturas, confundit isthæc omnia. Galenus (mea sententia) integerrimè rem hanc perfecit, nam totum negotium explicauit 3. 4. 5. & 6. lib. Methodi medendi, & præter actiones chirurgicas nescio quis possit explicare explicatum à Gal. Tamen cū longa sit explicatio ipsius; est enim (ut scitis) abundans in elocutione natura sua, & facilis in tractatione,

aliquod uulnus sub hac non contentum, ego in aliorum definitionibus multò plura inueniam.

De uulneris speciebus, & differentiis.

Cap. X.



Ista est uulneris natura eadem semper existens, habet tamen aliquot differentias, quæ maximè curationem uariant: quare proponendæ sunt uulnerum species, quæ plurimæ à Recentioribus proponuntur: nos autem ad curationem tantùm attinentes proponemus ortas à causis, à morbo ipso, à parte affecta, à modo, & consequentibus. A causa nulla uidetur oriri differentia, tamen dico, quòd quamuis causa procacatrica sit, tamè quia aliqua organa extrinseca inducunt malam qualitatem in uulneribus, & sunt uenenata; ut si gladius rubiginosus sit, uel limatus, curatio uarianda est. at nisi hæc adsint, non uariatur curatio: ideo dicimus uulnera alia uenenata esse, alia non: & per uenenum intelligimus omnem gladij infectionem: secundò succedit natura affectus, à qua oriuntur ueræ differentie ortæ, uel à quantitate, uel à figura, uel à situ, uel ab ætate, & de quibus loquebatur Gal. contra illos qui assignabāt inflammationem extrinsecus, & pro differentiis: sunt enim morbi per se consistentes, differentie autem per se non consistunt: magnitudinis ergo differentie etiam aliquid indicant in curatione. Habemus ergo uulnus magnum & paruum, profundum & superficiale: à figura rectum, obliquum, rotundum, &c. à situ uel sit per longum partis, uel per transversum, uel per obliquum. Hæc enim uariant curationem: recta enim uulnera ligamus, transversa consuimus: nam etsi in omnibus uulneribus indicetur agglutinatio, non tamen ob id tollitur uarietas curationis uulnerum, multa enim alia requiruntur: non enim solum medicamentis curatur res, sed tractatione chirurgica: & hoc patet; quia solo uino & aqua uulnera sanantur. A tempore oriuntur differentie, quas neglexerunt Moderni, & non appellant uulnus, nisi in principio quando cruentum est; habet enim sua tempora uulnus, quæ uariant curationem: quare uulnus aut est recens, aut antiquum, aut stans, aut declinans. Pars etiam affecta maximè est obseruanda: ipsa enim maximè uariat totam curationem. Vnde Gal. ad hoc tantùm respiciens, proponit differentias solutæ unitatis tantùm à loco affecto: iam per uolmetipfos partes corporis & differen-

3. Meth.

tias enumeretis. A' consequentibus differētiā etiam oriuntur: aliqua enim consequuntur uulnera, & ipsa uariant. De primis ueris accidentibus est cruoris fluxus, dolor & saniei decursus: omnibus uulneribus hæc habentibus cōuenit definitio uulneris. Hæc autem accidentia sunt consideranda; quoniam aliqua uulnera etiam per tres dies emittunt sanguinem, aliqua non; & ex his curatio uariatur præcipuè circa sectionem uenæ. Ego uellem ut obseruetis hoc quodd' chirurgi uestri sinant fluere maximam quantitatem sanguinis: ego enim testor semper sanatos fuisse eos, quibus adfui, & magna copia sanguinis effluxerit: & hoc maximi est momēti, nisi enim id fiat, uulnera recidiuant, aut succedunt crysmata, serpentesque miliare molēstissimi: quare ego expressi manibus sanguinem, & copiosissimum sinere permisi. Aliqua etiam uulnera cum dolore sunt, aliqua non: aliqua humidissima, aliqua siccissima, quæ differentiæ omnes uariant curationem. Attendendum ad consequentia impropria, ut ad ea quæ uulnera composita faciunt: compositi enim morbi maximè Medicos fatigant: quare notabitis uulnera composita cum inflammationibus, erisip. & dematibus, &c.

De causis uulnecum atque de signis.

Cap. XI.

4. Meth. 3.



Vnt causæ, signa atque præfagia uulnecum: uideamus primò circa causas. Habemus Medicos antiquissimos qui maximè ipsas inspexere, tanquam indicantes curationem. Hi accusantur à Gal. & meritò: nam causæ obseruandæ sunt tantùm duplici de causa, ut cognitionem præstent uulneris, aut, ut præmoncant nos de aliquo imminente malo, uel bono quod possit succedere: an etiam instrumentum magnum sit, acutum, ac ponderosum, an uenenatum, nec ne. Causa igitur omnis uulneris extrinseca est, aut animata, aut inanimata: multùm enim differt uulnus à gladio factum, & à morsu aliquo animalis alicuius. Signa autem non inuestigantur: oculis enim uulnera cognoscimus, pro signo autem habemus læSIONem & æIONis: habemus excuntia, quæ signa sunt uulnecum oculorum,



Erùm tertium caput additur, & est de præfagio: difficillimū est hoc caput. Debetis ergo scire quid sit præfagium in uulneribus: nam futura nuntianda sunt, & ante tertium diem; quod profectō periculum est: nam ars proponit septimum diem. Primō igitur uideamus quid præfagendum, secundō quæ ratione: duo sunt producenda ac pronuntiāda à Medico: alterum continet symptomata omnia uulneri contingentia usque in finem: de hoc non sis sollicitus; quoniā patebit hoc in curatione. Vltimum præfagium continet finem uulneris, mortem scilicet, aut uitam: sanitatem, aut non: & si citō, uel tardē, uel cum noxa partis ipsius, uel sine noxa ulla partis. Hæc igitur prædicenda sunt: præterea an noxa futura sit circa temperiem, aut situm: & si æger non sanabitur, uidendum est an moriturus, an possit uiuere. Quo in casu aliqua obseruanda: horum fieri necessariō aliquot, aliquot casu, & contingenter superuenire: sciendum est enim quod ratione successionis huius aliqua uulnera habent necessariō pro fine mortem, quæ lethalia & insanabilia dicuntur: aliqua saluberrima sunt; quæ necessariō sanantur, & ista pauca sunt, mitiaque: quædam non necessariō sanantur; sed semper afferunt noxam aliquam parti, & dicuntur malefica à nostris: contra quædam, ut plurimum: sed non necessariō mortem inferunt: & à Celso dicuntur periculosa: alia uulnera ex æquo se habent, & dicuntur graua, & difficilia uulnera, quæ bene tractata sanantur, secus minimē. Guido proponit signa horum sumpta primō à partibus affectis, secundō à morbo: sed hoc imperfectum est: quare ego quatuor propono capita: primō igitur partem obseruetis, secundō uulnus, tertio habitum, quarto res non naturales, quæ possibiles atque necessariam sanitatem, mortemue inducunt. Circa primum caput obseruandum est organum, atque eius dignitas. Secundō eius substantia: tertio temperies, quarto situs consideretur, quinto quantitas partis uulneratę numerus; ultimō conformatio atque usus, ac actio partis. In secundo capite obseruate magnitudinem, figuram, situm, symptomata consequentia, dolores, &c. ultimō alios morbos complicatos. In tertio cap. obseruate habitum totius corporis, & partium principalium: cachothymia enim mortē adfert. Habitus etiam singularum partium considerandus est: præterea an in toto, uel in parte aliqua, sit aliqua infectio mala cum feбри, aut mor-

Lethalia uulnera.

Malefica uulnera.
Lib. 5. cap. 16
Periculosa graua.

bus Gallicus: deludit enim nos sæpè morbus Gallicus, & similes affectus. Præterea etas est consideranda; nam uariat indicium: in quarto capite est uisus præsens & præteritus: nam qui inordinatè uiuunt raro sanantur: omnia igitur ad uisum attinentia cōsideranda sunt. pro exemplo sit hoc: uulneretur pars nobilis, & magna, principium facultatis, cōtinuo in motu, à gladio uenenato, in habitu malo, impossibile est quin succedat mors. Sic igitur obseruate etiam alios casus: primùm si cor uulneretur, necessariò uulnus est lethale, nullūque uisum est cor uulneratum, quod non intulerit mortē, uel subitam, uel citam: hoc etiā colligitur ex partis præstantia, cor enim nobilissimū est: substantia cordis dura hoc indicat, quæ glutinari nō poterit. Præterea cor est in cōtinuo motu; unde nunquā fiet cōsolidatio. Quarto obseruemus tēperie calidissimā, quare facile potest inflamari: unde necessariò mors succedit. Si autē uos addatis reliqua nō est dubiū quin uulnus lethale sit necessariò, & ideo Hippo. dicit, Omnes proponunt uulnera cordis lethalissima: succedit uena caua, cuius uulnera sunt lethalissima ratione usus: primò, quia continet totum sanguinē, & est illa cella uinaria, vnde euacuatur sanguis totus. Præterea substantia est neruosa, nec potest solidari: præterea à situ: nō possumus imponere manū, vnde non possumus suppressere sanguinem: quare necessariò moriuntur homines. Hoc dixit Gal. & Hipp. locis citatis: addatis arteriam aortam: quare in his mortem necessariam nuntiabit. Cerebri uulnera lethalia proponuntur ab omnibus. Verū in hoc est lis: nam præstantissimum est instrumentum: sed quò ad vitam, nobiliss est cor, verū quia non mouetur, frigidum est, molle, possumus colligere uulnus eius non esse lethale: quod si lethale sit; est ob magnitudinē vulneris, & circa basim eius, uel ob additos morbos, ut inflammationes &c. quare uulnus cerebri lethale est ut plurimum uel ex equo lethalia uulnera eius sunt, & non lethalia: habemus enim Gal. testem plurimos sanatos esse uulneratos in cerebro usque ad uentriculos: Guido exemplo proponit, Carpus. Et ego habeo multa exempla. Vidi in Zingaro quodam Ferrariæ in maximo frigore, Pado glaciato resectam continuitatem cerebri ad instar oui anseris, in maxima omnium rerum in opia; tamen est sanatus: quare cerebrum instrumentum non est vitæ, nec est durum, nec in motu. Præterea possumus manum apponere ad cerebrum: ergo nisi circa basim eius, in reliquis partibus homines uulnerati euadere possunt, licet raro. Sed Hipp. dicit, quòd homo uulneratus in cerebro moritur. Ad auctoritatem hanc respondet Gal. & d. debere intelligi de maximo uulnere cere-

Cordis uulnera lethalia.

6. Aph. 18. & in lib. Epid.

Vene caua, uulnera lethalia sunt.

Arteria aortæ. Cerebrum.

6. Aph. 18. & 18. 8. Vbi par. a principio

in lib. Epid. 6. Aph. 18.

cere-

compagatio naturalis. Si ergo unio est constitutio naturalis, solutio huius unitatis erit habitus præter naturā. si hoc est sequitur quòd ista solutio continui sit morbus ex Gal. passim. Sed quia morborum alij sunt simplices, alij compositi, alij communes, alij singulares (corpus enim humanum in partes similes & organicas diuiditur) simplicem morbum solemus appellare lædentem unam dispositionem naturalem; compositum, qui lædit plures dispositiones naturales, ut cælesactio manus est morbus simplex, quoniam corrumpit tantum temperiem & symmetriam frigiditatis, morbus compositus est ueluti inflammatio; quia ab ipsa corrumpuntur plures dispositiones naturales, ut quantitas & qualitas. at ab uno unum sit, cum ergo plures dispositiones corrumpantur & ab uno, hoc non est ab uno in quantum unum, ideo plures latent morbi sub hoc nomine inflammationis. Cognoscimus etiam morbos simplices ex læsione unius actionis, quoniam si lædit plures actiones affectio præter naturam maxima est, & composita. Videamus iam an solutio continui sit morbus simplex, uel compositus. Cum unio continui sit unica affectio naturalis, ergo eius solutio simplex erit morbus. Medici omnes in hanc uenerunt sententiam, quòd solutio continui sit morbus partium similarium: nam & ipsæ etiam omnes soluntur; sed cum instrumenta adhuc isto uitio laborent, ideo colligimus solutionem continui communem esse morbum ambabus his partibus, & in hoc omnes Medici & Gal. etiam conuenire.

1. & 1. Meth.

Morbus simplex & compositus.

Solutio continui est morbus compositus.

An solutio unitatis sit morbus partium similarium. Probatum quòd non contra Gal & alios. Cap. II.



Ideamus igitur an hoc sit uerum. Gal. 2. Meth. & alibi dicebat morbum esse quid præter naturam, à quo primo læditur actio: quamuis aliqui accusent Gal. quoniam morbus lædit facultatem primo, non actionem, quoniam facultas intercedit. hoc non uidetur leue, sed quia facultas hæc non apparet, quoniam non est in actu sed in potentia, hac ratione cum Medicus sit artifex sensatus, potest dicere morbum lædere actionem apparentem, non autem facultatem latentem, ideo rectè Gal. hic definiuit morbum (meo iudicio.) Supposita hac definitione morbi dico, quòd morbus partis alicuius est ille, ratione cuius læditur propria eius actio. Nam si læderetur in parti-

Morbus primo lædit facultatem.

J. Meth. 2.

bus similaribus, nec hⁱ gratia, motus, cum earum actio non sit motus, ideo morbus tollens hunc non dicitur proprius; quare morbus lædens actiones non proprias non est proprius. Carnis, exempli gratia, & ceterarum partium similarium propria actio est nutritio, reliquæ autem actiones sunt partium organicarum, quod si aliqua sit dispositio præter naturam, quæ non lædet actionem dicitur accidens tantum non morbus, ut vitis infecta colore aut liuido, aut nigro. His constitutis colligo solutionem continui non esse morbum partium similarium; quia non lædit earum propriam actionem, solutio enim continui non lædit nutritionem. Et mihi uidetur hæc ratio demonstrare. Probatur, quod solutio continui non lædat nutritionem, quoniam partes solutæ maximè nutriuntur, atque augentur & refarciuntur. Sed, dicit quis, non fit bona nutritio, quoniam non æquè puro caro restituitur. Sciatis hoc esse falsum; nam in vulncribus restituitur eadem caro & eiusdem speciei, idem dico de poro osseo genito in fractura; imò gignitur maior quantitas carnis, quàm fieret absque vulnere. Verùm aliquis dicit ex solutione continui lædi actionem partium similarium, quoniam sunt corpora continua, ergo debent pati, si diuiduntur contra suam naturam. patet, solutio continui impedit nutritionem, quia secta uena non amplius nutritur pars, cui inservit illa uena: præterea si pungatur nervus, ad puncturam hanc solet insequi spasmus, dolor & intemperies, quibus introductis à corpore pungente impeditur nutritio. non tamè hoc fit à solutione continui primò & per se, sed per multa media. Ad rationem illam, quod pars similis corpus sit, dico quod pars similis, quatenus corpus non est nec similis nec dissimilis, sed similis est, quia habet substantiam sibi undequaque omnino similem eademque temperiem. Pariter organum hoc non est organum, quia corpus, sed quia hæc figura, superficie, numero, & his actionibus, ac ista unitate donatur. Cum igitur partis similis essentialis & propria natura sit non ex unitate, ideo si hæc solvatur, unitas patitur, non tamen similaritas eius, ut ita dicam, propriaque eius natura. quare soluta unitas non est partium similarium morbus, sed instrumentalium, quarum primò actiones lædit, & hoc contra Gal. dictum sit uestri ingenij exercèdi gratia, non quod uelim hoc paradoxum supplantare. Secundo obseruate positionem omnium instrumentorum, & præsertim in instrumentis primi generis, ut est uena, arteria, ex natura ipsa si solvantur statim tollitur actio, scilicet retentio sanguinis: pariter soluto osse tollitur eius actio, idem dico de secundo ordine, & tertio instru-

Obiectio.
Solutio.

Obiectio.

[Solutio.

argutio.

instrumentorum. neque hoc indiget probatione, quòd soluta continitas malè afficiat instrumenta.

Defenditur Gal. & alij.

Cap. V.



I quis autem querat cur solutio hæc continui à Galeno & omnibus Medicis posita sit communis partibus similaribus, & organicis? crediderim hoc esse, quia multe partes similes sunt, quæ organa sunt similia: sed distinguendæ sunt hæ partes ratione usus, atque actionis, ut Gal. distinguit: & sic quinque erunt genera morborum, quibus affliguntur instrumenta, quatuor proposita à Gal. & ego addo quintum, quod commune positum est à Galeno: cum à me ponatur proprium instrumentalium.

Species solute unitatis ex Conciliatore.

Cap. VI.



Ed quoniam plurimæ sunt species solutæ unitatis, ideo hæ omnes unà cum differentiis cognoscendæ sunt ut vulneris naturam assequi possimus. Multi hoc tractauerunt; sed Conciliator Differentia 18. diligentius hoc tractauit ex Auic. Enumerat autem 14. aut 15. species continuitatis solutæ, quamuis Auic. addat quinque, quæ sub illis contineri possunt. Ponit ergo Concil. quatuor fontes, unde oriantur; primus est à loco affecto, nam pars à parte uariatur; secundus à solutionis positione in parte & à situ; tertius à magnitudine solutæ unitatis; quartus ab excremento resudante à soluta unitate. Quò ad primum locum à parte affecta continentur in eo, cutis, os, caro, uenæ, arteriæ, nerui, articuli, panniculi, &c. In secundo loco hæc obseruat circa situm solutæ unitatis, & primum extrinsecus, uel est secundum latus, uel secundum transuersum, uel secundum partis longitudinem. & hæc omnia sunt necessariò obseruanda. In tertio obseruat an solutio continui magna, an parua sit, quartò considerantur excrementa: nam diuersa sunt solutæ unitatis excrementa: ex his has eligit quatuordecim species. Demus primò solutionem continui in cute per longum paruam, non profundam. Hæc solutio continui dicitur scarificatio, & est prima species. Si au-

2. primi
dod.
prima c.4.

A parte af-
fecta locus.

tem hæc solutio sit magna & per transuersum dicitur excoriatio dum non sit multum profunda. Tertiò si in carnem fiat solutio, hæc dicitur uulnus, uel plaga. Si autem hæc solutio emittat multam sanicem est ulcus, & non uulnus, & est quarta species. Quintò si in carne uel osse fiat solutio per latum, dicitur incisio: si autem fiat per longum, est scissura, & ista est sexta species. Septima si ista magna sit, & per longum, dicitur contusio. Post has solutas continuïtates proponitur in neruo incisio, scissura, contusio. Si autem in musculis cadat solutio per transuersum, dicitur separatio circa extrema capita, & ab Auic. incisio: quòd si fiat per longum solutio, dicitur liquefactio, uel dissolutio; quæ uerba barbarè indidere, nec admittenda sunt. Si autem in chorda, uel neruo fiat solutio, dicitur attritio: in uenis & arteriis incisio & separatio: per longum uerò dicitur scissura: his Aui. addit perforationem, & artem sanguinis, quæ dicitur à Græcis aneurisma; & est solutio cum abscessu: si autem solutio sit in panniculis appellatur ab his ruptura, ut in disrptione peritonæi. in articulis autem dicitur dislocatio. Tot sunt species dissolutionis continui cum Conciliatore, quod ego non penitus probo; quoniam Gal. aliter species solutæ unitatis enumerat, qui ponit decem genera eius. Prima species est ulcus, secunda fractura, tertia uulnus, quarta rythma, uario modo transferunt: dicamus rupturam. quinta tlasma, id est contusio, sexta spasma, quod transferri potest conuulsus, non conuulsio, quæ spasmus dicitur à Gal. qui accusatur in hoc; sed immeritò. septima apostema diuulsus, octaua anastomosis hiatus dicatur à me si placet. nona est insultus, uel dissultus: ultima est erosio.

1. 3. & 4. & 6.
Meth. cap.
1. in lib. de
diff. morb. c.
11.

Declarat distas species à Gal. propositas Defendit Galenum.

Cap. V 11.



3. Meth. 1.

Solutæ continuïtatis decem species ex Gal. proposui, quæ primò sunt à me explicandæ. Secundò ostendam, quòd has confundit, tertiò quòd nulli methodo heret, & ego addam omnes species: prima species dicitur ulcus à Gal. quæ solutio est continui in parte carnosa: dicitur autem ulcus, quia distrahuntur partes dissolutæ in opposita. Catagma erat secunda species, soluta unitas in osse & fractura. Tertia uulnus: soluta unitas in parte carnosa cum perfectione tamen; & sub uulnere hoc continetur etiam punctura; quarta est rythma, quæ solutio est in musculis, nervosis parti-

partibus & uenis, & ruptura dicitur. Addatis contusionem, quæ est musculorum uel uasorum solutio: addatis spasma, id est conuulsium, quod solutam unitatem significat in neruo: apospasma autem est solutio ligamentorum, ictus autem est solutio extremorum uasorum, ac suorum ligamentorum, ac dissolutus est dissolutio in tortura uasorum, qui texuntur uariis filis, ultima est erosio, quæ est genus morbi mixti ex solutione ac amissione substantiæ, tamen est dissolutio: & est quasi propria uenarum. His rationibus Gale. explicat species solutionis continui, ita tamen, ut hanc rem confundat: nam 4. Meth. 2. hæc omnia confundit: nam dicit uulnus esse solutionem in musculo, uena, arteria, & neruo, quare uariat. Secundò dicebat rupturam esse in uasis ac musculis, deinde dicebat esse solutionem in neruis: tertio dicebat spasma esse in neruis, at in locis his dicit esse in parte carnosa. Addatis de apospasmate, quod dicit esse solutionem in omni organo. quare confundit hæc omnia. Hippocr. etiã uariat: nam appellat contusionem & rupturam in ossibus: uulnus ossi & cerebro ascribit, unde maxima arguitur difficultas. Hic non accusandus Gal. non enim uerba curat: sed secutus est sententiam Medicorum aliorum. Res enim semper maximè affectauit: unde sæpe neglexit enumerationem aliorum. Hoc autem ostendit 6. Meth. cap. 1. ubi subdit uoces curandas non esse his qui rerum cognitionem uenantur: & ideo non curat uoces, nec de his sollicitus est. Præterea alio modo possunt addi differentiæ soluti unitatis: nam istæ à Gal. propositæ assumuntur à parte ipsa; tamen differentiæ morborum à multis aliis accipiuntur, quas Gal. omisit; nec accusandus, quia semper propositum scopum ante oculos habens, qui erat docere numerum curandorum, & cum ad hunc scopum conducant differentiæ à parte affecta, ideo ab illa tantum sumplit occasionem diuidendæ solutæ unitatis, non tollitur tamen quæ & ambiguitas sit tollenda, & omnes species proponendæ sint solutæ unitatis.

De speciebus solutæ unitatis ex inuentione propria. Cap. VIII.



Rimò igitur ea proponenda sunt, quæ necessaria sunt ad uniuscuiusque morbi contemplationem. Et primum est causa morbi, secundum morbus, tertium pars affecta, quartum modus morbi, quintum accidentia morbum consequentia. Hæc igitur sunt semper ante oculos habenda; ex his enim capiamus omnes species. Dico igitur, quod cum aliquando fiat solutio con-

tinui

tinui ab extrinseco aliquo corpore afficiente ; aliquando ab intrinseco : hoc multum differt : facit enim non solum nomine , sed curatione differentiam ; nam cutis soluta gladio , & à fluxione aciei , non eodem modo curatur . Per corpus autem extrinsecum intelligo corpus esse contentum extra superficiem partis affectæ tum internam , tum externam ; nam , si quis deuorans uitrum patiatur uulnus in internis , illud corpus extrinsecum est , quoniam extra superficiem est intestinorum . Nota ergo , quod solutio non potest fieri , nisi per lineam , aut superficiem , aut punctum : cum igitur soluitur pars per lineam , aut per superficiem , à corpore extrinseco dicitur uulnus : nec à parte corporis oritur aliqua differentia , sed semper est uulnus , & est prima species solutæ unitatis , quæ dicitur plaga & ictus & incisio ; sed uocabo ego uulnus semper dum fiat cesim ab instrumento , scilicet cedente : sed uocatur ab Hippocr. aliis pluribus nominibus . Notandum tamen , quod hoc uulnus diuiditur ; quia quâdoque facta est separatio sine profunditate , quâdoque cum profunditate , in qua remaneat teli sedes , & dicitur hoc propriè uulnus : nisi autem sit profunditas uocatur scarificatio , quæ non est tantum in cute ; sed in omnibus etiam aliis partibus , quoniam scarificatio est solutio superficiei tenuis tantum facta . Quædam uerò solutio unitatis adeò manifesta est , ut oculis subiiciatur , quædam sensibus rectè percipi non potest . Exemplo patet : sit contusio in aliqua parte corporis ; illa soluta est , & non habet partes compaginatæ , & omnes Doctores consentiunt solutionem esse ; sed oculis non patet : in parte tumida adest solutio continui dissipati tumore , & non patet ad sensum : pariter quando rarefcit textura uenarum emanat sanguis , & solutum est continuum , sed non patet . Itaque quædam solutio est nota sensui , quædam uerò minimè : sed ratione tantum contemplabilis consequimur . Addatis secundo , quædam soluta unitas habet sedem in se instrumenti separantis , quædam non : quod in summa est , scarificatio dicitur : si autem fiat , ut hæc substantia diuidatur extrinseco instrumento , remaneat instrumenti sedes , & hæc sit momentanea , punctura uocatur , de qua Gal. 6. Meth. 1. & 3. Si uerò ab extrinseco corpore soluitur unio , & illa ad sensum non pateat , fit una solutio , quæ flasma , uel flaxis dicitur ab Hippocr. & Gal. à nostris collisio , uel contusio ; quia non remanet instrumenti soluentis sedes . Si quis pugno contundat oculos , soluit continuitatem extrinseco instrumento : & præterea non relinquitur pugni uestigium , nec baculi , sed tantum substantia collisa dissipatur , quamuis non pateat ad sensum . Notandum

dum tamen quòd aliquando solet accidere solutio manifesta cum non manifesta, & hoc est vulnus contusum dictum à Medicis, quonià est sedes telii instrumenti, & còtusio circa partes, ut tumor. Quatò aliquando accidit, ut eiusdem corporis partes manifestè separentur, aliquando immanifestè: ut distorta parte auelluntur partes simplices, ut quum cadimus ex alto: hoc fit in carceribus, quum suspenduntur brachijs, tunc muscoli anteriores thoracis, & iuxta scapulas manentes dissoluntur, & facta sunt uulnera & plagæ maximè aliquando etiam. Cùm igitur hoc modo dissoluantur partes aut nervosæ, aut carnosæ, de necessitate oritur spasma à Græcis & Hipp. apoplepsia uocatum, & ab Antiquis tilma: nos diuulsum uocamus ex Gal. 3. lib. de Off. Med. om. tex. 3. 1. à diuulsione in oppositas partes. Addamus quintum genus quod est, quòd aliquando accidit, ut dissolvatur pars ab aliquo corpore intimo, & fiat dissolutio, quòd corpus motu uiolento impellat partes, & ita dirumpat, & separet, & soluat còtinuum aliquando manifestè, aliquando immanifestè. Exemplum de intestinis & uenis. turgent uenæ aliquando, & dirumpuntur: sæpè flatus copiosus lacerat: intestina plena casu & nixu lacerant peritonæum, & ita fit talis species solutæ unitatis: fit etiam ab humoribus; qui aliquando currentes per spacia media separant partes, & talis diuisio immanifesta est: prima manifesta est, quæ fit in uenis laceratis, quæ fit in cavitatibus tumorum, in abscessibus: abscessus est soluta continuitas per abscissionem partium: omnes istæ solutiones continui dicuntur rigma à Græcis, id est ruptura, uel eruptio: si fuerit immanifesta facit rarefactionem uenæ, & diapedisis dicitur, id est insultus, quia quum rarefacta est substantia uenæ ab humore impellente, tunc sensim humor defluit. Si erit in extremis capillamentis uenarum, quædam solutio immanifesta ad oculum fiet: quando aliquis hæmorodibus laborat uos uidebitis sanguinem copiosè effluentem; sed apertionem nullam, & hæc soluta continuitas sub ruptura ponitur; & anastomotis, id est oris apertio dicitur. Addatis ultimò, quòd ista soluta continuitas reperitur in omni genere tumorum: ista non habet locum nisi nomine communi in soluta continuitate, quia nunquam per se reperitur: sed cum conformatione corrupta. Addamus sextò, quod est, quando soluitur continuitas cum ablatione partis: digitus patitur solutionem continui ita, ut extrema non coniungantur cum alia parte: ista ablatio substantiæ, aut à causa interna, aut ab externa fit; si à causa interna fit, semper fit à materia erodente, unde nascuntur ulcera, & hic est proprius locus ulceris: nam ulcus à uul-

cerebri, & vesicæ. Præterea uideor aliam expositionem inuenisse meliorem ex a. proprit. nam non possum dicere nisi secundum Gal. q. intelligat de maximis vulneribus: quia ibi Hipp. se exponit quod partes vulnerata si inferant mortem; oportet, ut sint ualidissime vulnerata: nam natura partium; & numeros. obseruandus est: quare Hipp. ibi intelligit: si pars ualide vulnerata sit; pernicioſa sunt vulnera. Addatis hepar; quod non habet omnia vulnera lethalia: aliqua enim tantum lethalia sunt necessariò, aliqua minimè: substantia hepatis facillimè regeneratur, nec tollitur sanguificatio ablata substantia eius dimidia: videmus enim homines uiuere cum hepate obſeſſo à scyrrho; quare idem potest esse in vulnere: si enim pars vulneratur una, altera agit officium suum: sed difficultas est ratione partium, ex quibus constituitur, & ratione situs; nam non possumus imponere medicamenta, quare circa venam cauam inflicto vulnere est lethale necessariò, at secus minimè: habemus enim plurima testimonia. Sed aduertatis circa Gal. ubi assert sententiam eam de fibris hepatis ablatis. In diaphragmate, si pars carnosà: vulnerata est vulnera grauiasunt, nec possunt medicamenta apponi. Præterea est in motu, & circa thoracem fiunt maximæ inflammationes, & faciliè, in parte neruosa necessaria est mors: semper enim succedit delirium, inflatio, quandoque conuulsio: nunquam medicamenta apponere possumus: hoc omnes testantur, & Gal. 5. Meth. cap. 9. De pulmonibus uidi inflatos sanatos: inflatos etiam mortuos, quare vulnera pulmonis ex aquo se habent. Vnum à Celſo notatur, quod si vulnus sit in parte crassa uenæ arteriosæ, necessaria est mors propter continuu motum pulmonum; nec sanguis fisci potest. cognoscetis autem hoc ex natura sanguinis, quod niger erit, quod erit signum sanguinis effusi ab hepate, & uena caua. Succedit medulla spinalis, cuius vulnera lethalia ponuntur ab Hipp. Vidi tamen aliquos sanatos; sed, si vulnus sit in partibus superioribus, necessariò succedit mors, & conuulsio partium inferiorum. Vesicæ vulnera, maximè in parte neruosa lethalia sunt, dummodò adsint aliæ conditiones, uidi enim vulneratum sclopeto: tertium igitur addo, quod vulnus non sit in parte illa, in qua vesica ligatur à lateribus, nam per ligamentum illud concreſcit caro, & fit sanitas, ut in milite, qui mingeſſet ex femore, quia uesica erat perforata in ea parte: quare hoc obseruetis. Lienis quoque habenda est ratio, qui, si vulneretur, non necessariò infert mortem. Quoniam præstantia membri, & principalitas non est in liene, nec est principium vllius facultatis: sed si vulneretur

an. 17
an. 17

Hepar.

6. Aph. 18.
diaplr. gma
an. 17

Pulmones

Medulla spinalis.

Vesica.

Lien.

Vesica fel-
lis.

Renes.

Ventriculus.

Intestina.

Mesenterii.
Vena.

lien circa vasa magna, & in profunditate, tunc necessario infert mortem propter sanguinis copiam; non possumus enim imponere manum ad suppressendum. Scio aliquos fuisse huius sententiae licentia intergrum auferri posse, & sub Imperatore Turcarum id fieri referunt. Sed ego non disputo hoc; quoniam nunquam vidi. De vesica felle dicendum quod necessario adfert lethum ob situm; quia non possumus mederi, secundo ob substantiam nervosam; quia conglutinari non potest: tertio propter excrementa quae continet, quae corrumpunt interiora, & ideo eveniet mors necessaria; sed non momentanea; quoniam diuturno tempore durat: in renibus duo habemus: substantiam, & inuolucra nervorum: si ren vulneretur in substantia propria, etiam quod sit magnum vulnus, dummodo vulnus non penetret, & tangat nervos, non est necessaria mors; ut plurimum tamen succedit ex inflammatione: si contingat vulnus circa cavitatem, & profunditatem, tunc erit brevissimo tempore mors, nisi vulnus paruum sit. Ego vidi ren sinistram pugione vulneratum sanari: quia concrevit parenchima sanguis ille crassius concrevit in carnem. De utriculo habeo quod dicam: nam sanavi mulierem, & hominem, à quibus egrediebatur chylus, & cibus. Sanavi mulierem glande percussam plumbea ab anteriori, & posteriori parte. Et hanc Deus sanavit: quia meretrix quondam fuit, iam castè, & sanctè vivit. Si autem fuerit in ore ventriculi insigne vulnus, tunc succedit mors ob praestantiam partis, ob nexum, quem habet cum corde, & omni genere nervoso. Succedit post vulnus syncope cordis, & totius corporis defectus. Sanatur tamen ventriculus; quoniam exhibemus glutinantia per os. Intestina vulnerata plurimos interficiunt, sed sanantur, quum possumus suere, & ego vidi aliquos in intestinis vulneratos, & non potuimus suere, qui adhuc vivunt, ergo non necessario inferunt lethum; sed, ut plurimum. Et ego quum essem in patria mea mulierem vidi laborantem hernia, quidam secuit intestinum, & iam ex eo loco emittit feces, & vivit adhuc: si suatur ergo intestinum vulnus est ad utrumque ad mortem, & ad vitam. De mesenterio: inevitabilis est mors. De venis magnis circa alas, & inguina: dico quod non sunt lethalia, ut plurimum si adsit bonus minister, qui possit suppressere sanguinem. Lethalia sunt absente Medico, cum sanguinis copia defluit. De istis dico, quod ut plurimum non interficiunt: necessario nunquam interficiunt: ista sunt vulnera, ut sciatis ferre iudicium de morte necessaria, & non necessaria: alia sunt quae necessario non sanantur, ut

in

in cauitate, quæ est supra supercilium, vbi est cauitas supra oculos: Cauitas supercilii.
 ista cauitas necessariò non sanatur: si comminatur os, in illa parte, Nervi Ligamenta.
 nunquàm sanatur: sed ego possum dicere in vita mea vidisse hoc, in
 nobili scholari foroiulensi: repleta est carne pars ista, & hoc mi-
 raculum fuit: in cæteris nunquàm vidit. Idem dico de gula, vbi vulnere
 fistula succedit. Accedit thorax, qui nunquàm mortem infert, dùmmodò
 interiora non tangantur; ut plurimùm tamè fistulæ eueniunt: multos
 sanavi; sed hoc rarum est, & Deo adiutore. Hæc sunt obseruanda:
 quædam sunt, quæ cum sanentur solent inferre noxam membro, &
 facultatibus: ut uentriculi uulneratio sit imbecillitatis, cerebri sto-
 liditatis iudicium. si etiam uidetis neruum læsum, neruum punctum,
 neruum sectum; ligamentum etiam reiectum, caput ossis læsum,
 semper pronuntiate membri læsionem, & ista sunt malefica uulne-
 ra. Quotiescunque uidi uulneratum ligamentum articuli uel ner-
 uum, semper secuturum pronuntiaui membro impedimentum. Sed Casus nota-
bilis.
 uidi militem uulneratum in genu, & amputatum erat ferè totum in-
 ternum os, ego totum resecuri & ià ambulat non læsus, nō claudus, sed
 rectus. Ego uidi hoc rarò: si hoc sit adscribatis uestre præstati-
 onis. Sed solent secari muscoli per transversum, & in eo casu sole-
 mus inferre impedimentum membri inferioris, & ita pronuntiare:
 sed hoc non est uerum, quando musculus fuerit in medio resectus Musculi.
 per transversum, si potestis bene sanare pronuntiate sanitatē. Sed si
 musculus sit in capite læsus pronuntiate læsionem, uel in inferiori, uel
 in superiori parte: & ego habeo plura exempla. Vltimò quoties ui-
 detis uulnus in articulo, in quo humiditas egrediatur (non est arti-
 culus in nostro corpore, qui non habeat mucum) pronuntiate læsio-
 nem illius, nam, quā egressa est humiditas illa naturalis arefcit arti-
 culus, & ideo moueri non potest. ista uobis sunt memoranda & dili-
 genter examinanda. Habetis ergo quid sit uulnus: differentias eius:
 quomodo præfigire debemus de uulnere: modò succedit ut ad cu-
 rationem eius descendamus.

De ordine in curatione uulnerrum seruando. Cap. XIII.

Vulnera curanda hoc nobis sunt ordine primùm simplex, se-
 cundò cum propriis accidentibus, ut cum dolore, &c. Ter-
 tiò complicatum cum aliis morbis peculiaribus, quartò
 sunt propria loca sananda. simplicis igitur uulneris præcedat cura-
 tio, mox dolentis, deinde inflammati, denum curentur uulnera ca-
 pitis, thoracis, &c.

*De simplici vulnere, ac duplici unione, per agglutinationem
scilicet, ac per colligationem. Cap. XIII.*



Sal. 1. Art.
med. c. 89.

Prima unio.

1. Art. med.
cap. 91.
Secunda unio

3. de comp.
med. loc. c.
de plaga ca
pit.

Vò ad primū cū simplex vulnus sit curandum de ne-
cessitate sequitur, ut curatio sit una, & simplicissima,
ma, quod debet Medicus respicere. Cumque sit illi
positio præternaturalis, atque solutio continui op-
positum est unitas, ergo oritur indicatio unien-
dis, atque scopus Medici est, ut omnia in unionem intea-
dat. Verūm ut hoc commodè fiat oportet, ut obseruemus non unā
esse copulationem aliquando uulneratæ partes uniuntur per aggluti-
nationem, & cohalitum, ueluti si portiones duas ceræ caperemus,
& coniungeremus hæc conglutinatio uocatur, quoniam ita simul
coniunguntur sicuti lutum si luto iungatur, talis coniunctio conglu-
tinatio dicitur, quoniam pars per se mollis, ac uiscida alteri parti
molli, ac uiscidæ copulatur. Hæc est prima unio, & est naturalis, ue-
ra, & perfecta unio in qua uix uestigium solutionis apparet; & hæc
à nostris prima intentio appellatur: unde chirurgi dicunt procede-
re per uiam primæ intentionis, & de hac Gal. loquens
nuncupat, quod idem est cum primo scopo. Alio modo unimus par-
tes separatas per colligationem, quam uocat, quando non
possumus facere, ut particula una cum alia agglutinetur assumimus
extrinsecum, quo ligantur partes; quū pannum panno filo hincin-
de perforante coniungimus. Vos uidistis fabrum ferrarium acci-
pientem gemina ferra: ista non coniunguntur, sed adiecto stamno,
uel plumbo, uel ære extrinseco uniuntur; & hæc non est agglutina-
tio; est potius colligatio; similiter si hoc sit per intrinsecam, cum me-
dio quodam coniungatur. Hoc accidit in uulneribus quæ interme-
dio cōiunguntur, ut cū connascitur caro, uerbi gratia, sit uolnus in
femore, non possunt partes agglutinari, nascetur caro, quæ copulet
partes; hæc unio colligantia uocatur, à Galeno uerò
hoc est concarnatio; & hic est secundus scopus: deficiente primo
scilicet agglutinatione unimus concretionem carnis intrinsecæ: uel
extrinsecæ aliquo, ut cū fracta est uena, coniungitur carne nascentē
super foramen uenæ: concludentes ergo dicimus omnem solutio-
nem debere unione auferri, & hic est scopus Medici. Hoc autem du-
pliciter fieri potest aut agglutinatione, aut interueniente aliquo me-
dio uel simili, uel dissimili, & hic est secundus scopus, uel secunda
intentio.

De

De ijs quæ curantur per agglutinationem.

Cap. XV.



Ed quæ sunt quæ primum scopum recipiunt? omnes partes carnosæ: spermaticæ in principio naturæ, in principio fœtus, in reliqua ætate spermaticæ partes non possunt per primam intentionem sanari, sed sanantur secunda intentione ante septimum annum, excepto osse per primam intentionem curationem

admittunt, post septimum annum per secundam. Sed est locus Galeni molestiam afferens: loquens enim de hac agglutinatione dicit, curatio solutionis intentionem habet unionem, quæ in partibus instrumentarijs impossibilis est, in similaribus non semper possibilibus; ex quo colligimus, quod quum pars similis est vulnere sanari potest, in partibus dissimilaribus vulnere curatio impossibilis, si ergo digitus vulnere riliquendus est pro impossibili. Qui interpretantur Gal. pro solutione continui intelligunt reiectionem ut, si digitus seceur, cadet, & ita amittet animam, & ideo non potest coniungi cum parte uiua, quia mortuum & uiuum proportionem non habent, & ideo non copulationem, at inquirunt partes similes etiam per trāsuerfum testæ possunt coniungi, ut in puerulis per agglutinationem sectio uenæ sanatur, ita ossis, arteriæ, nerui, & si per primam intentionem sanari non potest, ad minus per secundam. Sed brachium amputatum nullo modo. Verum hoc est falsum & Galenus non sibi consentire uidetur: multa enim instrumenta ex auctoritate Gal. non solum per secundam, sed per primam sanata sunt intentionem, ut nerui, uenæ, arteriæ in puerulis. Hæc autem in lib. de morb. diff. cap. 4. uocat instrumenta, ergo cum instrumenta sanata sint à Gal. falsum est, quod dicunt. Hoc autem non uiderunt qui interpretati sunt Gal. Ad hoc igitur dicamus primò malam esse interpretationem istorum, nam per solutionem non reiectionem intelligimus, siue nos amputemus digitum, siue partem carnis nullus que ret coniungere; aliud est recidere, aliud secare per trāsuerfum, si secatur digitus, & remaneat aliqua pellicula uiuens coniungitur, & sanatur; hoc expertus sum in naso, & auriculis multorum. Dico igitur, quod Gal. per diuisionem intelligit solutam unitatem, quæcumque fuerit. dixit Gal. quod non coniungitur. hoc stante uideamus modò, quum dixit instrumenta non coniungi non contradicit sibi: nam hoc non uomen organi fuit in causa magnarum difficultatum apud Gal. dupliciter enim sumitur, aliquando pro parte deseruiente alteri

Locus Gal.

Cap. 90. Art. med.

Expositio aliorum.

rj. Med. in lib. de semine.

Solutio propria.

Organum.



alteri parti, ut gladius non est instrumentum per se, sed deseruiens agenti. Ita uenæ, arteriæ, nerui non habent facultatem propter se ipsos. Vena continet ne sanguinem propter se ? non : sed ut hepatis, & cordi inseruiat ; cùm ergo particulam illam, quæ habet operationem alii inseruientem uocemus instrumentum ideo instrumenta dicuntur. Hoc est primum significatum instrumenti, & in hoc significato falsa est sententia Gal. quòd instrumentum uulneratum non potest uniri, quia uenæ, & cetera uniuntur ; sed per instrumentum intellexit partem contradistinctam parti simplici : omnes etenim partes aut simplices sunt, aut còpositæ : simplices sunt substantiæ neruosa, carnosæ, &c. còpositæ sunt oculus, digitus, &c. per instrumentum ergo intelligimus partem còpositam ex partibus simplicibus, & in hoc casu uera est sententia Gal. quòd istæ partes si soluantur non possunt uniri. Sed est instantia: Ego uidi Germanum nocte uulneratum in digito medio manus, qui diuisus est per medium, & cutis, & os, & caro, & tamen sanauit eum iam agitur quartus annus. Hoc non uidetur difficile. Semper sunt scriptores apertis oculis legendi : uidete Galenum ibi, qui loquitur de unione primi scopi quam còglutinationem uocant: dicit ibi Gal. Veluti carnosæ, quæ agglutinantur: ecce quomodo de unione primi scopi loquitur, quoniã nulla est pars còposita, quæ còglutinari possit. Quod, si non creditis, legatis Gal. in 91. cap. sequenti, quia patefaciet loqui de primo scopo, quum loquitur de uulnere ossis, dicit: Si autem os patiatur solutionem continui non potest uniri, uti dixi, & subiunxit postea, Potest tamen uniri per secundum scopum, ecce clara est sententia Gal. uos nunquã reperiētis aliquod instrumentum, partem còpositam diuisam per longum, aut transuersum, quæ agglutinetur. Sunt ligatæ partes à poro, & carne. Et ideo remanere solet digitus crassior, & mouens se, idem dico, de naso, auriculis, &c. semper nascitur caro media uel aliquod intermedium, quo colligantur partes. Primum ergo, quod querit Medicus, est unio, & hæc duplex, uel in agglutinatione, & hoc fit in partibus similaribus, & in uasis spermaticis ante septimum annum, uel per ligationem, quia caro, uel intermedium, uel circumpositum ligamentum nascatur, & hic est secundus scopus, & à Medicis uocatur secunda intentio. Quos scopos, si assequamur sanabimus quodcunque uulnus. Verum notandum unum, quod nisi uobis pateat, facit difficultatem: quòd nostri Chirurgici per primam intentionem intelligunt largo modo: & ita laxior est significatio primæ intentionis apud chirurgos, quàm primus

Instantia.

Solutio.

primus scopus apud Gal. nam si fiat uulnus in facie, & suatur, etiam si in eo caruncula nasceretur, ueluti si cartam cartę glutino coniungamus, conglutinatione uocatur, ita chirurgici, etiam si caro nascatur inter partes agglutinationem uocant: sed uera agglutinatione, & primus scopus est, quum intermedium nullomodo adest. Ceterum nostri Chirurgi decepti paucio medio putant esse primum scopum, ad uertatis tamen, quod non erit sanatum prima intentione, si medium quantumuis minimū intercedit, tunc enim est secundus scopus. Dicit quis, cur ita incallescis in hac re tam parui momenti? Multum facit hoc, nam nisi id cribraueritis, Hippocrates bonus senex non saluaretur: quum dicit, præputium sectū non coalescit, consentiens cū Arist. similiter de auricula. Duplex est cohalitus, aut quia conglutinetur, aut quia media caro suboritur: si auricula amputatur, & non suatur, nūquā sanatur, oportet suere, ut mediū nascatur; si loquamur de cohalitu primę intentionis, auriculę nō coalescunt; cartilago cartilaginei nō coalescit, quia duo sunt simul dura, ubi nō consuatur, cavitās impletur carne: ut ergo Hippocratem saluemus oportet distinctionem hanc facere: ego possum testari uobis multas auriculas uidisse coniunctas: omnes dicunt ad Hipp. quod huiusmodi partes non coniunguntur sine medio. Hac ratione dico; si uultis seruare auctoritatem Hipp. oportet seruare primam intentionem, quę nullo medio fit: & non assentiamini Medicis nostris uocantibus paucio medio agglutinatas partes primam intentionem: non enim hæc est prima, sed secunda intentio: si non consuereamus partes illas exangues non posset nasci caro implens cavitatem, & ideo fuimus. hac igitur ratione omnia soluetis dubia, & omnes difficultates circa hanc materiam contingentes. Ad institutum igitur nostrum redeuntes dicimus quod Medici munus est cognoscere an uulnus possit prima uel secunda coniungi intentione: debetque id diligenter examinare. Notando tamen quod multa per primam intentionem sanari possunt, sed tamen aliquando impedimenta succedentia, de quibus infra dicam, prohibent.

6. Ap. 19.

De causis agentibus. Cap. XVI.



Inis MEDICI est coniungere partes uel primo uel secundo modo: oportet considerare causas: has Gal. uult geminas esse, naturam scilicet atque Medicum. Natura est uera effectrix illius, quod agglutinamus; natura autem non potest agere nisi Medicus auxilietur. Verum adiungerem tertium, & esset

90 cap. Art.
Med. 3. meth
4.

set medicamentum, unde Gal. nomine Medici hoc idem significare uoluit: cum autem uideam multa uulnera Medico absente insanabilia esse quandoque medicamentum absque Medico sanare, & Medicum absque Medicamento id præstare non posse, ergo tria sunt necessaria, Natura, Medicus, & Medicamentum. effectrix uero, & immediata est natura: concurrentes causæ sunt medicamentum, & Medicus: at natura non potest operari, nisi impedimentis ablatis: natura sanat; ceterum si non sanat, est, quia impedita est, ad tollenda impedimenta se exercet Medicus, per accidens ergo sanat Medicus, & medicamentum; si natura non fuerit impedita per se sanat.

De impediētibz naturam. Cap. XVII.

Mala cōfor-
matio.



Quatuor sunt ex Gal. loco citato, quæ impediunt naturam, & primum, est mala conformatio, quæ est cā ut à natura sanari non possit. Secundum est mala conformatio duratio, tertium est additio corporis præter naturam: si enim in uulnere corpus ceciderit diuersæ substantiæ, impeditur. Quartum est in salubritas partis affectæ, non dico insalubritatem uulneris, sed subiectæ partis, quæ ad alterationem pertinet, non est dubium quod si distemperata, si inflammata fuerint partes, si ferrum in uulnere, nunquam sanatur uulnus. Sex autem sunt, in quibus Medicus debet esse sollicitus, ut natura non habeat impedimentum. Et primò aduertendum ne extraneum in uulnus incidat. Secundum est, ut si quid inciderit extrahatur. Tertium, ut semper in omni uulnere labia coniungantur. Quartum, ut labia coniuncta conseruentur coniuncta. Quintum, ut symptomata auferantur. Sextum est, ut natura integra partis seruetur, & corrupta restituatur, aliter, nisi Medicus hæc procurent, nunquam natura sanabit. ex his sex quædam ad Medicum pertinent tantum, ut primum, secundum, & tertium à nobis supra proposita, quæ natura, & medicamentum facere non possunt; duo sunt propria medicamenti, & est quintum, & sextum: duo sunt quæ partim à Medico, partim à medicamento fiunt, ut extractio ferri, & conseruatio labiorum; nullum istorum fit à Natura, in primo igitur sit sollicitus noster Medicus ne aliquod extraneum incidat in uulnus. Ego aliquando fui uocatus ad uulnus confutum ab Empiricis, ipsi conseruunt nulla utendo diligentia, ut si barba uulneretur multi pili in fundo uulneris decidunt, sanguis decurrit, mutatur uulnus, in quarto

vel quinto die postea apparent pili, prius autem de uulneris mutatio ne dubitabamus, monete Empiricos, ut sint diligentes in hoc, quoniam non possunt postea facile extrahi. quoties occurreret, quis accipiat telam, uel corpus molle, & in initio expleat uulnus, ne capilli decidant: ego uidi quarta die sanata uulnera ueluti si nihil passæ fuissent partes. Secundò nota ne oleum, & unctuosæ cadant in uulnus, quoniam ista agglutinationem impediunt; primò quia humectant, & calefaciunt; secundò quia corpora unctuosæ habent substantiam diù perdurantem, & ita impediunt substantiam carnosam, ne agglutinetur: iccirco Gal. & Cels. prohibent hoc: quare quum mandamus, ut oleo ros. circumpositæ partes, diluantur, ne guttulæ in partem affectam distillent. Paulus notat aduertendum, ne arena in uulnus profluat, ac impediatur agglutinationem, seu ipsa cum carne agglutinetur. Vidi multos concidentes, quorû uulnus arena plenum necesse fuit consuere. Fuit puer lapide ictus, huic remansit calx in osse, absterxi, secui, & omnia tentavi, non potui extrahere, iâ uidetur pars interior alba temporis illius pueri, quæ apparet clarè, etiam si caro concreuit. aduertite ergo ne extraneum infuset in uulnus ueluti pili, unctuosum corpus, arena, aut calx, impediunt. n. compositionem. Gal. quintetiam tertio meth. Aet. lib. 14. cap. 26. & Paul. lib. 4. cap. 36. monent obseruandum ne humor præter naturam infuset in uulnus, ne humiditas ichorosa, uel saniosa, uel cruor ipse, qui concreseat in grumum solidationem remorentur.

Quomodo in uulneribus sanguis est suppressendus.

Cap. XVIII.



Celsus monet ut Chirurgus diligentissimè conspiciat quantum sanguinis egressum est. Si paucum, faciat, ut multum egrediatur secundum habitum corporis; si carnosum corpus, ad libras egrediatur comprimendo, & alia agendo, nam triplo, & quatuorplus citius uulnus sanatur; postquam egressa est sanguinis quantitas, monet Celsus, ut linamentis siccis expleatur uulnus. Linamenta uocant filamenta, quum linteola attrita accipimus ex filis excerptis: moneo uos ut caueatis ne recurratis ad gossipiû, quoniam quamuis supprimat sanguinè tamen ita hæret carni, ut non possit auelli; & ita impeditur consolidatio: nec utamini stuppa sicca, quoniam

Lib. 5. c. 147.
Ex uulneribus sanguis copiosus effluat.

Gossipium

Stuppa.

niam ea extracta sanguinē nouiter fluere uidebitis. Monet Celsus, ut spongia madida aqua frigida, uel aceto etiam imponatur, & tunc est quando humiditas sanguinea, uel grumosa iussit. Sed cautē ut a mur aceto duabus de caulis: prima, quia acetum dolorem facit: secunda causa, quia sua qualitate offendit uulnera, quoniam adstringit, & retinet materiam non solum impediētem, sed bonam proportionatam. Adiungit Aetius, quod rigidas reddat partes sua uirtute adstringenti, ita ut agglutinari non possint, & ideo utamini posca aceto scilicet diluto, aqua: quando uideo, quod ex usu linamentorum aqua frigida imbutorum non fit sanguinis detentio, accipio

Polca.

quatuor partes aque, & aceti unam, si potest bibi, mixtio satis bene se habet; quoniam non potest dari alia norma, pp qualitatem aceti uariam: accipio poscam egelidam, non frigidissimam, quia frigidum uulneribus inimicum. Notate aliud quod quamuis Celsus, & Aetius dicant adstringere acetum, intelligite habere uim siccantem, refrigerando repellerem, atque per accidens constipationem sequi; non quod acetum per se adstringens sit, nisi uinum, ex quo fit adstringens fuerit; ita posca ista tepida impediemus humiditatē quālibet impediētē, in quibus humiditatibus, & sordibus sollicitus esse debes.

Quod relinquenda uia uulneri, ex qua id quod retinetur, effluat. Cap. XVIII.



Nter illa quæ possunt corrui in uulnera not. ex 90. cap. art. medic. quod non solum influentia in principio debetis cauere, sed in successu curationis debetis aduertere, quod sunt uulnera habentia cavitates profundas in quibus semper cadere aliquid potest: & ideo (dicit Gal.) faciamus suffluxionem, & est, ut quādo sumus tractaturi uulnus, relinquatur hostiolum, & uia, qua, quod retinetur, effluat. exempli gratia habeam uulnus in capite, & magna pars cutis caderet, ego primū auferrem omnia contentia, postea sicurem, tertio reducerem cutim in loco suo, & in parte inferiori foramen facerem, & postea consuerem: foramen facerem, ut collectum in uulnere effluat, & reliquæ partes agglutinentur; ideo in extremitatibus solent linamenta ponere, ut cavitates seruetur, & foramen. In qua re laudandi sunt aliquo modo, aliquo modo non: nisi maxima sint uulnera, nunquam inponenda linamenta, si parua uulnera, nullo modo.

Quid

Quid pus, quid ichor, quid sordes.

Cap. XX.



ET quoniam puris, ichoris, sanieque mentio fiet, ideo hoc declaremus. notandū q̄ ego reperio excrementorum, quæ confluunt ad vulnera, varias voces apud scriptores: quos in tres distinguo classes, Græcos, Latinos, & Barbaros nostros, qui barbarè loquuntur, apud Barbaros inuenio sordem, sordiuē, & aquosam, & oleosam humiditatem, sanie, &c. apud Latinos ueros ut Celsum, reperio sanie, pus, ichora, melyciron, & pus oleosum. Apud Græcos & Gal. & Hipp. tres præcipuas voces inuenio. Et prima est ichor, secunda sordes, tertia pus, quæ uobis opus est declarare. Et primum de ichore, ego dum reperio hoc apud Gal. uideo, quod non semper eadem est res; sed aliquando capitur pro humiditate aquosa, quæ est mixta cum massa sanguinea, & est aqua tincta sanguine, & hæc frequenter ichor uocatur, aliquando ichor aquosus, aliquando ^{Acutus} idest tenuis: de qua loquens Gal. dicebat, Quando in vulnere fit inflammatio, quæro an semper ichor effluat. Et declarans dicit, Per ichorem intelligo humiditatem aquosam mixtam sanguine, sed ista est grossior flatu. Galenus ergo intelligit per ichorem sanguinem aqueum. Aliquando Galen. intelligit quamlibet humiditatem tenuem, quæ egrediatur ex vulneribus, passam aliquam concoctionem, & alterationem; prima significatio est de sanguine nondum digesto, nec alterato ob corruptelam, uti Gal. testatur, ubi excrementū ulcerum & uulnerū distinguit: sed postea istius ichoris facit duo genera, & alterū concoctionē appellat; alterum crudum, & in concoctum primus est bonus ichor, & est idem quasi cum pure: secundus est foetidus putridus: nam quoties ichor egreditur ex vulneribus alteratus, non concoctus foetidus est: quando ergo dico ichorem dico duplex excrementum: quod si habet notas bonas coctas, ichor coctus vocatur; si malas notas, ichor dicitur crudus. ego uellem ut Interpretes semper hunc humorem uerè, & distinctè traduxissent: ipsi aliquando uertunt uno modo, aliquando alio indiscriminatim. Sordes etiam apud Gal. dicitur: nos intelligimus excrementum ex vulneribus exiens contraductum ichori; nam idem accidit vulneribus quod in omni concoctione; quoniam aliud excrementum nascitur crassum, aliud tenue. Sordes est excrementum tenue, album, bonas habens notas, & idem est cum pure apud Gal. aliquando apud Gal. significat sordes genus excrementi ita duri, & ita crassi ut à vulneribus

lib. 5. ca. 146

Ichor.

in li. 8. tom. pr. nat. ca. 30

3. Meth. 1.

3. Meth. 9.

2. Ad Glau. 8.

3. Meth. 10.

Sordes.

neribus abstergeri non possit, ita hæret eis, & assatum dici debet: unde sunt sordida ulcera, & hæc dicitur connata sordes; quia ista humiditas solet ita vulneribus adhærere ut caro supernata uideatur: & eam cognoscetis ex uiscositate, quam non nisi gossipio eripere potestis, vel medicamento robusto uel manu. Gal. dicit, quod si vlcus erit sordidum, requirit medicamentum robustum: & ibidem uocat sordem uiscosum excrementum, crassum, quasi sit caro concreta. Per ichorem uero humiditatem inanentem à vulneribus intelligo. Pus autem ex 2. aph. 47. in lib. de fract. 1. & 2. aph. in lib. de vulner. vox est propria Hipp. & Galeni etiam, & est proprium excrementum vulnorum in generatione carnis: & est concoctum excrementum, quod fit dum generatur bona caro, & tales sunt eius notæ ex Hipp. ut sit album, cinerei scilicet coloris, æquale, nullus grumos habens, nullumque sctorem; hacque ratione non ita facile effluit ut ichor, nec ita hæret, ut sordes. Hoc ex Gal. 2. ad Glauc. cap. 8. & 5. Meth. cap. 10. habebitis, & inuenietis differentiam inter pus, & duos alios humores: cum ergo dico sordem intelligo crassitiem; quum dico ichorem intelligo aquam sanguineam, quum dico pus audio medium inter hæc non ita fluidum, nec ita hærens. Celsus uero lib. 5. appellat pus excrementum quoddam in vulneribus, quod est album, crassum, sanguine glutinosius. Et per sanguinem intelligit sanguinem calidum, adhuc fluentem, & liquidum; nam quum concreuit in grumum glutinosior est. Alterum est sanies coloratum, variè crassum, & est veluti gelu ichoris: per ichorem Celsus intelligit saniem ex malo ulcere prouenientem. Meliceriam uero appellat humiditatem similem melli albo. Ultimo est pus oleosum, & est quædam humiditas pinguis, tenuis, subalbida, & oleosa, & hoc solet egredi ex vulneribus ossium, & nernorum. Hæc sunt apud Celsum. Recentiores omnia nominant sub nomine saniei, & tres species ponunt. prima est concocta æqualis, & quæ habet notas puris Galeni, & Celsi, & vocatur bona, & laudabilis sanies, quoties hæc nomina auditis, audite pus bene coctum: aliquando intelligunt ichorem, vel meliceriam, vel pus oleosum per saniem, & quoties est excrementum foetidum vocant saniem; & vocant aliquod frigidum ex materia frigida, aliquod calidum ratione materię calidæ, sed tamen semper excrementum est frigidum; aliquando nomine saniei vocant sordem, ut cum est excrementum crassum, quod distinguunt in album, nigrum, & cinerulentum, & est sordes Galeni. His constitutis coniungamus noua veteribus. Quod Pion à Gal. à Celfo pus, à barbaris sanies bona,

uel

3. Met. 10.

Ichor.
pusin lib. de p.
dia.

Celsiopinio

Recentior.

uel laudabilis: dicitur secundò ichor Gal. vocatur à Celso sanies, vel ichor uel meliceria vel pus oleosum, à Recentioribus sanies foetens, virus, & virulencia: tertio yipos hoc est sordes Gal. ab his sanies grossa nuncupatur.

De excrementorum in vulneribus materia & causis.
Cap. XXI.



OMNIBVS excrementorū traditis, videndū est quā ratione fit, vt ex vulneribus hæc redundet, & ita excrementorū causas & materiā inueniemus. Et primū quo ad excrementū, quod geminū ex vulneribus exit diximus, alterū quod nō passum est, alterū uerò quod sic. Primū dicimus esse humiditatē cruētā quæ redundat cum sanguine, quando hæc exit? quum capillamenta uenarum sunt aperta, & ideo, quia tenuis est, effluit, & nihil passa est in parte affecta, sed est ichor aquosus secundū Gal, ideo quotiescūque à vulnere prodit humiditas isthæc, dicite vulnus ichorosum. Nam duæ sunt vulneris passionēs: statim etenim fit cruentum; secundò fit ichorosum. Sed dicet quis, Quomodo cognoscā hanc humiditatem quæ exit à venis? prius à colore, erit sicut lotura carniū, dum modò purus sanguis contineatur in ipsa massa, in venis. Si autem sanguis fuerit biliosus, erit flauus, luteus ichor; si melancholicus erit sanguis, ichor nigrior, atrior apparebit. Secundò à substantia: quia huiusmodi materia tenuis est, si enim est lutea & crassa, non est ichor; oportet igitur, vt substantia sit penitus aquosa, & tenuis. Addatis tertio, vt nullum habeat foetorem; nā si esset foetidum indicio est, quod aliquid passum est, & alteratum & corruptum est in loco affecto, istud erit excrementum uulneris, & non uenarum: igitur si excrementum erit coloris loturæ carnis, tenuis, non crassus, nullumque foetidum habebit odorem, uocabitis ichorem, excrementum uenarū, non uulneris. Excrementi autem uulneris causa est, alteratio, quæ ueniat à calore: & quia hic calor uariè alterat humiditates, ideo uarium est. Dicebat Gale. quod tres sunt mutationes in humoribus, altera est à calore naturali, qui semper agit in materiam à principio usque ad finem. Exempli gratia, calor naturalis agit in sanguinem purum, & cōuertit in carnem: si sanguis est pituitosus, non cōuertit in carnē. Moneo vos vt intelligatis verba Gal. nam ubi dicit, Familiari animantis natura, legite, Materia, non Natura: quia materiam oportet esse fa-

*s. de simp.
med. fac. ca.
pi. 6.*

miliarem animā. Secūda est alteratio, quæ fit à calore præter naturam, & ista dicitur putrefactio, & corruptio, quæ fit cū putredine fœtente: & (vt dicit Gal.) in hoc genere alterationis duo obseruare possumus, quòd aliquādo bona materia corrūpatur à calore malo, & alteretur, aliquādo mala materia, & hæc peior est, & ideo alterationes istę suam habent differentiā. Tertia alteratio est, quæ fit partim à calore præter naturam, partim à naturali, ita vt naturalis uincat: nam quamuis non possit vincere materiam, vt conuertat in substantiam, tamen ita eam temperat, vt non lædat, & ideo mala materia non dicitur; si vinceret præternaturalis esset secunda, quæ dicitur putredo. Prima alteratio non fit in uulneribus, ita vt excrementum conuertatur in carnem, quia non esset excrementum. Secunda alteratio apparet in uulneribus, ac etiam tertia: & ita omnis excrementi, quod sit verum excrementum uulneris, causa efficiens duplex est, aut calor putredinalis malus, aut naturalis non uincens ex toto, sed in parte præter naturalem. & primus de sanie, quæ erat ichor, virus, virulētia causa efficiens est calor putredinalis quoties in uulnere contrahitur intemperies, quæ labefactat calorem naturalem, & facit frigiditatem, aut auget calorem, & facit eum igneum, corrumpuntur humores, & ideo fœtent, quia patiuntur secundam alterationem, quę finiebat in putredinem olidam: cur autem istius vel illius coloris? Si est materia flaua: flauum colorem habet si est biliosa materia, quoties erit calor naturalis validus non solum in hepate, sed etiā in quauis parte; quod dico de flauo, idē intelligo de nigro & albo. Notate tamē q, ista quauis fiant à calore putredinali, differunt per magis & minus; & hæc varietas depēdet aut à materie diuersitate, aut ratione loci. In profunda parte minùs perspirat putredo, & ideo ratio inæqualitatis putredinis à loci & materie diuersitate prouenit. Cū autem est intemperies, quæ nō vincit naturalem calorem, sed impedit, ut in carnem nō uertat, vertit in excrementum, quod pus, seu sanie coctā uocant. Nam duplex excrementum apud Gal. esse dixi, alterum crassum, scilicet sordem, alterum tenue, quod ipse uocat pus. De isto dico quòd sanies non habens fœtorem, nec inæqualitatem est istud pus: non fit à calore integro; semper vulnerata parte laborat calor naturalis, vel per admixtionem frigidi, vel à diuisione ipsius caloris dominatur tamen calor naturalis; quia nō adest fœtor, omnis humor desinit in putredinem olidam, si non fit à calore naturali tantū. Sanies tamē oritur duplex quum calor naturalis vincit, scilicet tenuis & crassa: sed hoc prouenit ratione materie, si substantia materie tenuis, sanies te-

nuis, si crassa, crassa. Coctum & non coctum dependet ratione caloris; crassum & non crassum dependet ratione materie. Si autem fiat, ut contingat error Medici, aut sit intemperies sicca, fiet tertia excrementi boni species, quæ dicitur sordes, in qua non est fetor, & ideo agitur à calore naturali vincente: sed fit ita crassa, vel quia Medicus erravit, quia imposuit medicamentum siccantia; natura uolebat facere pus, medicamentum exsiccauit. Secundò si Medicus reliquit nimis detectum vulnus, & ita ambiente frigido bonum pus crassius factum est. Tertiò quia adsit intemperies sicca, ut si sit pars sicca, quâuis adsit calor, tamen sit sordes. Habetis igitur efficientem causam excrementorum: materia autem una est ex Gal. & est humiditas, sed variat nunc uno modo, nunc alio. Sed Hippo. in lib. de Vlceribus tenet esse sanguinem, ubi dicit, Alimento & feruescente sanguine pus fit. At ego dico eum intelligere omnes humores in sanguine contentos: sed Galen. & Hippoc. addunt carnem ipsam; nam aliquando caro contusa eliquatur, concoquitur, & conuertitur in excrementum; itaque vel caro contusa, uel humiditas fluens ad locum erit materia excrementorum. Habemus ergo varia excrementorum nomina, species, causam efficientem, & materiam.

Materia excrementorum.

1. Aph. 47.

De extractione sagittarum & telorum in uulneribus infixorum. Cap. XXXI.



Propositis illis sex rebus diligentissimè obseruandis, primum iam patet, quòd defendenda sint vulnera, ne quid impediens solidationem illabatur. Alterum succedit, ut quicquid in vulnere sit, totum extrahatur, ut optime vulnus solidetur. Tria autem sunt genera rerum, quæ possunt in uulneribus esse: primum est, quod habet coniunctionem cum homine, secundum remotum, tertium remotissimum. Primum est, quum aut grumus, aut pili, aut barba sunt. Grumosum sanguinem tentabit gossipio, vel linteolo; quod si non succedet, tentabit ferro. Antiqui, ut Celsus, & alij solebāt aqua pura detergere, aliqui aceto; hoc nimis dolorosum est: in hoc casu poscam cum pauco aceto habeatis: sed aliquando utor oximellite aqua mixto, nam habet maiorem vim detergendi ratione mellis & aceti, & aqua remouet dolorem: cum ergo grumus impedit solidationem, & (ut dicit Gal.) dolorē faciet, modo dicto procedatis. Cum autem barba, vel pili fuerint, aqua ablue, & huiusmodi posca. Si verò remo-

Grumus quo modo extrahitur.

Posca.

3 Meth. 4 Pili.

ta ca-

Calk & arena.

Fuligo.

Instrumentum.

3 Idus. 94.

Casus.

ta cadent, vt calx & arena, remouenda penitus sunt, ne remaneat calx sicut in puero dixi: tamē hoc perpetuum non est, sed si potestis remouere, moneo, vt remoueat. Inter hæc quæ remanent fuligo numeratur. Ego curauī ancillam, quæ cōcidit scala, & in olla ænea caput percussit, ita vt pars ollæ intrauerit in faciem. omnia agenda tentauī; ab altera parte vulneris erat infecta nigrore fuliginis; ego non potui remouere: & uidebitis homines habētes cruces in brachiis fuligine factas, gladiolo prius brachia perforante in cute: & ideo moneo uos, vt non sinatis, vt chirurgi currant ad exultum gossipium, quod impossibile parti oportunitum est ad extinguendum sanguinem; tamē nigredo illa remanet, ita quod uidebitur vir in facie, vel alia parte uisibili habere sigillum, sicuti fuisset in manibus Turcarum. Aliquando accidit instrumentum, vel partem eius, à quo factum est vulnus non esse remota à vulnere; vt frusta vitri, arundinum, squamas piscium, sagittas, pugionum frusta. Vidi mille vulneratos pugione durissimo, & cuspidē lanceæ, & in osse humano horum frustum habuisse; miror quomodo os possit frangere ferrum. Sed frequentissimē accidit glandes plumbeas remanere, & hoc quā sapissimē: præterea retinētur cum instrumentis partes indumentorum; secum enim trahunt glandes indumenta; & si sit lorica ferrea, vel squamata, inducūtur in corpus anuli, & ferreæ laminæ: ideo Medicus debet diligentissimē hæc extrahere. & tria in hoc casu respiciēda sunt: primū uidendum est an extrahi possit, & an tutum sit, ut extrahatur nec ne: & si non extrahitur an possit sanari vulnus non extracta materia. Nam debetis scire, quod nisi facillima sit extractio, non extrahatis; si potest uiuere homo non extracta materia. Si homo haberet mille globos in corpore, nūquam debetis tentare extractionē; infiniti sunt qui sagittas & globos plumbeos habent. Gal. proponit quatuor hominum genera, qui habebant sagittas in corpore, & non laborabant: & ego habeo exemplum nobilissima Principum habentium glandes plumbeas, & nihil patiētium. Ego post quintum annum extraxi glandem plumbeam receptā in inguine: & etiam extraxi iuxta genu: cū ergo uidemus posse sanari vulnera, sanemus: si est periculum extrahendi, non extrahamus. Ex cauitate thoracis extraxi laminam ferream hac ætate cuidam nobili, quam habuerat per nouem annos. Ego habui casum in muliere metricula, cui fuit percussa facies phiala stercore plena: intra oculum frustum vitri habuit, non aderant symptomata mala: ego curauī solidationē, & curata est: nihil aliud symptoma patitur, & credo quod sit sextus annus, nisi quod clauso altero oculo, & remanente altero percusso

perculso vitro, aperto res maiores videntur quàm sint, & nihil aliud. Secundum cap. à Gal. propositum est. Si nos possumus extrahere materiam est videndum an superuiurus sit homo nec ne. Si non est superuiurus, cauendum est; nam multi exhalant animas in nostris manibus, quod non est agendum. & est quum gladij sunt infixi cordi: similiter quum gladium infixum videmus dorso, vel venæ causæ, vel musculo temporali, vel basi cerebri: tunc non debemus extrahere instrumenta, quia statim percunt: multi per integrum diem reuixerunt non extracto instrumento: primum hoc est propter maximam sanguinis emissionem; secundò propter alterationem maximam. Si verò extractio sit ita, quòd superuiuere possit infirmus; demus etiam, quòd sine noxa non possit remanere, extrahendum est instrumentum. Et hoc dupliciter fecerunt Antiqui, aliquando instrumentis, aliquando medicamentis: idem faciunt Recentiores. Extrahunt instrumentis ea, quæ facile comprehendendi possunt: nam instrumentum in momento temporis extrahit, medicamentum longum tempus requirit. Cum ergo instrumentis possumus uti, instrumenta capiamus. Secundò utimur instrumentis, quum dubitamus de tumoribus & abscessibus corrumpentibus partes, statim tunc deueniendum ad instrumenta. Tertiò videndum si adsit suspitio veneni, ad instrumenta currendum. Sin contrà difficilis sit extractio, ita quòd facile instrumento non possumus, & non est suspitio tumoris & veneni ad medicamenta confugiendum. Quoties ergo fuerit spina, vitrum & frustum acus, quæ extrahi non possunt sine maximo dolore, & carnis apertione, recurrimus ad medicamenta, inter quæ sunt incantationes; & Theodo. lib. 1. c. 23. & alii docent modum, quo per incantationes extrahuntur: quod si verum esset, quâto ex labore leuaret nos? sed ego nunquam credidi, nec credam. Monet ut ter oratione Dominica dicta, dicamus, Niçodemus extrahit. Non est mirum si iste hæc dixerit: ego multoties litigavi cum his qui nunquam extraxerunt susurris multis. Excusabant se de infidelitate mea. Ex Gal. igitur oportet ponere medicamentum attrahens: triplexque est genus: primò est, quod sua temperatura habet facultatē, qua hoc faciat, cum hoc frigori, aut calori adscribi non possit. Talia sunt alexipharmaca, quæ attrahunt ad se omne genus veneni; & inter illa quæ attrahunt à tota substantia non videtur ibi ponere attrahentia spicula: tamē legatis apud Paulū quod alterius habet vim attrahendi spicula à vulneribus: medicamentum diabotanum habet vim extrahendi frustula ossium: natura horum medicamentorum frigida est. non possunt extrahere per facultatē calidā, nec per putredinē, ergo à quadā latenti temperie hoc facient.

1 Meth.

Non extrahenda relinquitur.

Duplex extractio, instrumentis, & medicamentis.

Incantationes.

5. de simpl. med. c. 17.

4. lib. c. 31.

Secundū ge-
nus extrahē-
tium.

Tertium ge-
nus.

so. simpl.

cient. Et ita inter medicamēta quæ extrahunt ratione substantiæ erit alterius, & papauer cornutū. alterū genus extrahētium Gal. est; quod putredine sua, eò quod putruerit aliquid caliditatis acquisiuerit, id operatur, & hoc in genere viscū numeratur: omne enim genus visci fit per putredinē, quæ putredo cōmunicat illi corpora tenuia, & calida. Fermētum etiā, quod cū putrescat acquirit calorē: addit Gal. ster- cus colūbinum nō siccū, sed coaceruemus eū, quum calefcere inci- pit & putrescere: triticū putridū habet etiam vim extrahēdi. Tertiū genus (inquit Gal.) est corū medicamētorum, quæ habēt tēperamen- tum calidū nō calidissimū, hoc est in tertio, vel secundo gradu, & sint substantiæ tenuis, vt penetrare possint, tenuitate sc̄parāt, quod est in- fixum ab eo, in quo est infixum: ego numero tantū simplicia. Pri- mum est propolis cera virgo appellata. Secunda est radix arundinis, cēpa narcissi, cēpa cōmunis dicta, vel allium coctum, pix naualis hu- mida, resinā pini nihil passa, talis qualis ex pino adducitur, gladioli ra- dix, xihimali radix, aristoladię recentis radix, dictami recētis folia & flores. Nos habemus dictami albi radicem. Gummi elimi primas ha- bet in hoc opere; assa fœtida, ammoniaci lachryma. Gal. proponit ca- pita lacertarum, quę tenuitate ac caliditate sua id pręstant: addatis anagallidis vtriusque succum, & illius, quæ rubrum, & illius, quæ al- bum florem facit.

De medicamentis extrahentibus compositis. Cap. XXIII.



Vmerauī simplicia pharmaca, relinquebantur com- posita, nam raro solemus uti simplicibus, non quia non habent vim, sed quia ratione occulta solent sim- plicia frustrari suo fine: & ideo cōponimus aliqua simul inter quæ gemina proponam, quæ ego com- posui: quando spiculum est extrahendum, & uos non timetis uenenum, uel aliud Recip. propolis, radic. arist. sagape- ni an. drac. i. s. fermenti, stercoreis colūb. putrefacti an. unc. i. narcissi cēpam unam, picis naualis liquidæ, mellis crudi an. q. s. hæc con- tundenda, & miscenda in mortario, ut formetur emplastrum. Si au- tem isto ualētius requiratur, poteritis hoc secundum addere, quod infixum ossibus, & in intimis partibus, quod extrahi nō potest balista, extrahit. Recip. rad. dictam nostratis, pulu. dictam, eret. sagap. as- sę fœtidæ, gūm. elimi, an. drac. i. uisci quercini, unc. s. & si nō potestis habere quercinum, accipiatis quodcūque; nam ex mille libris uisci non

non habemus unam uisci quercini, quia paucissima quantitas eius fit. si possumus habere quercinū habeamus, resinæ pini unc. 1. s. euforb. gran. 5. sulfuris scrop. 2. picis liquidæ, mellis crudi an. q. s. mortario miscantur. non negligenda sunt, quæ ab aliis scriptoribus descripta sunt. & primum à Guid. in antid. ab Auic. lib. 5. sub nomine Andromachi, medicamentum tamen Auicennæ est. Addatis emplastrum, quod uocatur ufsia; alterum mellinum serapionis, tertium uetus uocatur. Et hæc describit Aetius lib. 15. cap. 14. enumerō hæc, ut uos possitis habere uaria medicamenta. nam, si quæ est actio quæ debet fieri à medicamentis, quàm eisdem, & semper habere nō possumus, hæc una est: hæc tamen omnia, tria medicamenta Galeni superant: inter quæ unum est descriptum 3. de comp. med. per genera: est ex Euforbio. Ratio multiplex, & uaria est: potestis colligere, ex Gal. uerbis. secundum est in 6. eiusdem, & dicitur non dicitur id est emplastrum ex herbis. duo ibi describit Gal. ego intelligo de priori, quod habet uim extrahendi sine noxa: secundum noxiū est, quia medicamenta recipit: de hoc dico, quod occulta qualitate expellit spicula, quia recipit alumen, quod habet uim adstringendi, & frigidum est, tamen scriptores, & ego testor id præstare, quod dixi. est etiam altercus, & folia papaueris cornuti. Vltimum medicamentū est quod sacrum dicitur, quia repertum est in sacra æde Egypti, & describitur à plurimis, primum à Paulo, deinde à Gal. in 5. lib. de comp. med. per gen. cap. 2. 4. & 10. nullibi eodem modo. 10. cap. ex autoritate Democ. iambico uersu contentum. & ibi continentur impossibilia, quia docet miscere duas libras litarg. cum tribus libris olei, quod impossibile. descripsit ex autoritate Asclep. & Hærg. & uidetur approbare Galenus Asclepiadis descriptionem quāuis parum differat. sed duobus modis paratur, uel ut extrahit tantum, uel ut etiam faciat ad maligna ulcera, & siccāda ossa. hoc secundo modo recipit multa, quæ non recipit primo modo. Ego docebo propriam compositionem, quæ facit ad hūc usum. Recip. olei ueteris, (si æstas erit.) lib. 1. si hyems 1. s. litarg. lib. 1. colophonæ lib. s. ceræ unc. 3. ammon. arist. rotund. an. unc. 2. mannæ thuris, galbani unc. 1. s. ærug. æris, dictam. cret. aloes, propolis ana un. 1. squamæ æris, gnetianæ an. drag. 6. talis est compositio: primum coquimus litarg. cum oleo: secundo addimus squamam, & æruginem, tertio admiscemus ceram, resinam, & ammon. quartò reliqua; & ita coquitur ut medicamentum non inquinat manum, semper lento igne. His medicamentis extrahemus spicula.

Cap. 4.

Cap. 1. in principio.

& fieda. nam si dolor successit, non dimittendum ad nonum diem. si uidemus fluxum sanguinis, & timemus ne extrahatur magna sanguinis copia differemus ad nonum diem. si uideris factum uulnus in strumēto uenenato, statim extrahatis: diligentissimè ergo hæc quatuor sunt obseruanda, ut habeamus quinque illa proposita.

Quæstio de tempore extractionis teli à vulneribus. Cap. XXV.



Nixum est uulneri telum, extrahendum est, quæritur an statim; an post tempus extrahendum, quod erat primum caput. in hoc non omnes consentiunt. Nam inter Recentiores Ioann. de Vigo lib. primo suæ practicæ compendiosæ cap. 9. asserit, quòd statim debemus aperire, & educere, secare carnes, & comminuere, contrariam proferunt sententiam Auic. & Albucasis, qui dicunt pertranscundum tempus tumoris, & quum putrescere incipit vulnus, extrahere. quam sententiam Guido approbat: & meliores hanc opinionem sectantur, ut cum compensazione omnia fiant, & non ita ex abrupto. sed mihi placet nimis sententia Ioan. de Vigo. uellem auferre statim, si possem, atque eò magis, si adsit dolor ingens excitatus à spiculo, etiam si maior dolor excitetur, quonià postea, & maior, & minor cessabit: secundò, si ferrum fuerit ueneno, aut rubigine infectum. prætermittatis dilationem, educite statim, etiam si auferre integros musculos necesse sit, secare uenam, & nervos, consulendum est toti, non partibus. quamuis hoc rarò fiat. & ferro, ignite quonià cõuulsionis cessabit periculù: & si uenenu substatu sit infixum ferro cãdēti extinguitur. laudò ergo in hoc Ioannē de Vigo. laudo Auic. si timemus fluxionem sanguinis, uel maius symptoma. præterea obseruemus naturam teli, nam si non fuerit latum tunc tutò fiet expectare occasionem, quia ad profundum peruenit. tertio si factus sit tumor, & inflammatio, ita ut vulnus sit factum angustum. quarto si non habetis instrumentum opportunum. Ego uidi chirurgum doctissimum, qui secuit cranium, ubi erant frustra ossium, petiit cultrum, quo operando membranam duobus uulneribus lethabilibus percussit.

Io. de Vigo

Auic.

Propria op

Quæstio an per eandem viam extrahenda spicula. Cap. XXVI.



Irca tertium an per eandem viam extrahenda spicula nec ne. in hoc casu Albuc. Auic. Cels. lib. 7. cap. 5. dicunt semper eadem viam, qua ingressum est telus extrahendum: ratio est ne addamus vulneri vulnus. Verum, quamuis hæc sit communis ratio actionis, aliquando tamen opus est, ut per partem sanam edu-

camus, & in hoc casu tutò fiet, si pauca erunt incidenda. Fuit superioribus annis scolaris glâde sclopettaria percussus circa umbilicū & peruenit usq; ad lumbas, ego tangebam glandem, quæro an glans erat extrahenda à parte, à qua intrauit? in eo casu secui partem sanā, quia non nisi cutem perforavi, & inde glandem extraxi. sed obseruandum est, ne uena adsit, uel nervus, etenim tunc ex parte, qua intrauit, extrahendum est telum, & expectare quoad caro putrescat. Ad uertenda quinetiam est figura teli, quia quædam sua natura sunt quæ per aliud sunt retrahenda. glans plumbea facit vulnus rotundum, & sic telum latum sufficiens est ad extrahendum. Sed sunt multæ species sagittarum, aliæ enim sunt bilingues; aliæ unum mucronem habentes; aliæ triangulares, aliæ quadrangulares: omnes species tutò possumus extrahere, sed bilinguem non tutò possumus: at sunt sagittæ appellatæ barbulatæ habentes in extremo gemina spicula, quæ insiguntur carni, si uolumus extrahere, & contrahuntur, & hæc sunt diabolicæ, unde obseruandum est hoc. & ultra hoc aliæ sunt habentes caudam, qui est apex ferreus, qui inseritur in lignum, tubulus est alter, quum est foramen infixum ligno. si est ueluti clauus infixus ligno, sunt sagittæ Turcarum. aliæ habent calicem, & tubulum, & tales sunt sagittæ nostrorum Zafforum, & rarò fit quin Zuffa fiat inter scholares, & Zaffos tempore noctis: illæ ergo, quæ habent tubulū facilius extrahuntur, per instrumentum oportunitum. Turcæ uerò ita imbecilli glutine cōiungunt ferrum ligno, ut statim dissoluatur quū corpus humanum sagitta intrat madefacta sanguine: ego habui præ manibus quinque, aut sex, quas eduxi. sed Zafforum sagittæ facilius extrahuntur, quia clauo insigunt tubulum, etenim sunt boni uiri, nō quærent ex toto humanam perniciem. Itaque si uidēbitis sagittam non barbulatam, & non habentem caudam, per partes per quas intrat extrahenda erit. & uiceuersa si spiculum habuerit caudas illas si ue hamulos illos, potestis incidendo alia ex parte extrahere, dummodò uenæ uel nerui non fiat fractio.

Questio an sint integra spicula extrahenda. Cap. XXVI I.

E tertio an sint integra spicula extrahenda? in hoc casu scitote quod omnia frangibilia (quantum fieri potest) integra sunt educenda, ueluti uitra, & ofsa. & hæc est ratio, quia in paruula frustra comminui solent, & sic non possunt capi; & quod dixi de hoc, multò magis dico de glandibus plumbeis, non tentate fracturam, quoniam facillimè plumbum deraditur, & remanent rasuræ illæ impediētes consolidationem: si autem non possumus integra educere sine dolore, minuenda sunt. & in hoc casu in barbulatis sagittis, uideamus si possumus torquere, & frangere.

An recta, an transversa uia educenda spicula. Cap. XXVII.

ED de quarto an recta, an transversa uia educenda spicula, non possumus docere: oportet enim vulnus uidere, tamē in hoc casu habemus præceptū, & hoc est, quod debet semper cōstitui in eo habitu, in quo erat, quando erat vulneratus, collocate ergo vulnerratum in eo situ, in quo erat quādo ictum percepit. Secundum præceptum est, ut ligetur, uel comprehendatur à fidiis amicis, qui fortiter teneant brachia infirmi, coxas, & tibias: oportet autem esse ministros robustos, & ualidi animi, ne eger dimoueat, & ita succederet conuulsio: posset enim in illum locum concurrere corda, aut neruus. Hoc non dicendum in glandibus plumbeis. Erat scholaris custos meretricis Brixienfis nomine Borgomēsis cuiusdam: accesserunt Genuēses ut tollerent eam. Habebat Brixienfis sclopertam quæ casu Ancillam percussit glandes (hos uocant dados) ingressæ sunt femora, & ego extraxi omnes à pede, quo deuenerunt: ergo collocandi sunt infirmi in eo loco, & dispositione, in qua erant, quum uulnerati sunt, sed non in glandibus plumbeis id tenendum, quia nunquam recta uia procedunt, uerum oblique decidunt in partem aliquam curuæ respondentēs ingressui.

mitate, & cum hac cavitare caudam sagittæ impellere possum: si autem oportet tubulum habens sagittam extrahere, habemus impellens surdum, quod non habet cavitatem, nam surda dicuntur, quæ foramine carent: hoc instrumentum habet acutiem, quam habet sagitta infixa ferro, & ita ope huius expello ferrum uel ad sinistram, uel ad dextram; uel directè, uel transuersè. Undecimum est forfex incidens sagittas, & hoc est acutissimum, & in usu uenit in incidendis laminis ex lorica, & in alatis sagittis; hoc autem non potest fieri, nisi forfice calibeo fortissimo. Duodecimum est forfex semilunaris Aui cennæ, qui est species tenaculæ: oportet ut sit tortus in modum rostri coruini, ideo rostrum coruinum uocatur, & iste forfex factus est, ut in vulnere circulari globuli plumbei obliquè infixi extrahâtur. Decimum tertium est forceps cannulatus, tenacula cannulata uocatur: hæc debet habere ambas partes cannulatas, & ad extrahēdas sagittas barbatae deseruit, & commodissimè facit. Addatis decimūquartum forcipem anserinum: tenacula anserina dicitur, quia ita curuata est in extrema parte, ut rotundum, & cauum habeat, ubi delitere possit globulus plumbeus, in superficie interiori aspera scobinæ modo; & ita eripit globulum, ut dilabi non possit; in superiori parte leuis est, & pulita. Hæc tenacula lapillorum extractores utuntur à uescicis. Decimum quintum est anserina tenacula non dentata; habēt enim etiā dentatam, non dentata utuntur ad extrahendos globulos faciliores. Decimum sextum est Alphonstinum organum, quod excogitauit Alphonfus, qui Romæ artem exercet, quod triplici digito constat, & habet anulum, quo constringitur. ita collectum imponimus uulnere, quum uenit ad globum plumbeum trahimus anulum, & sic aperitur; capta glande iterum descendente anulo extrahimus. Addatis decimum septimum spatam anserinam quoddam instrumentum ferreū simillimum Auriscalpio sed maius est, & habet similitudinem rostri anserini in extremo, & est exasperatum. Decimum octauo habemus specillum anulatum. Habemus stilum, uel specillum, in cuius extrema parte est anulus magnitudinis illius, quæ potest esse globulus plumbeus. formate anulum ex ferro magnitudine globuli; in superficie exteriori teres est, in inferiori est planus. Impellimus hunc usque ad globum, & tunc mouemus globum usque in cavitatem anuli, unde postea extrahimus. Decimum octauum cannula est cum terebello, per quam fistulam genus terebelli immittitur, & utimur, quum ossi infixus est globulus. Imponimus fistulam, supra glandem, intra fistulam terebellum immittimus, & sic terebramus glandem, & extrahi-

- mus. Imponimus fistulam, ne fugiat globus, & ut in medio terebretur. Vigefimum est balista, quam quidem trahunt, & apponunt ad os, & cordæ applicant instrumentum, quo globum terebrarunt, & sic uiolenter attrahunt, explosione illa ictu uiolentissimo cordæ & arcus educit. Vigefimum primum graphisus dioclis à Celso lib. 7. cap. 6. descriptum, & est pulcherrimum instrumentum nullumq; isto præstantius ad extrahenda spicula, & sagittas. Notate, castigetis quendam locum, quum dicit [in parte inclinata, quæ perforata est] expungite illam uocem [quæ] quia oratio erit plana: tantum uim habet in corrigendo hoc loco illud [quæ] quod nō poteritis illud instrumentum intelligere, nisi illa detracta. Ista sunt instrumenta oportuna uaria excogitata, & à uobis etiam excogitanda: sed qui isthæc habuerit poterit diligentissime mederi.

De unione. Cap. XXX.



1. Meth. 4.

TERTIUM in curandis vulneribus erat unio, compositio, vel coniunctio partium vulneratarum; nam statim, quum vulneratur quis: partes vulneratæ aperiantur, quas oportet primò coniungere, ut ait Gal. Hæc actio Medici solius est sine ope Medicamentorum, & naturæ. ideo multum in hac actione videndum, & sunt imprimis duo obseruanda. primum est lenitas; secundum æqualitas. lenitas est, ut leniter adducat partes, non subito, sed sensim, & sensim. Aequalitas est, ut ex æquo trahamus labia vulnerum. Tertium, ut diligenter obseruemus, an partes ex æquo molles, an vna hæreat ossi, altera minimè: nam si ex æquo molles fuerint, ex æquo sunt trahendæ, & si vna naturaliter dura ossi hærens, altera mollis, illa solum extrahenda: si autem frigore ambiēti riguerint partes, uel Medicus optimè, & æqualiter non coniunxerit, in eo casu accipiemus aquam, & oleum, hydreleon à Græcis dictum, postea calefaciemus, & sic partes iungemus uapore eleuato, uel assumamus spongiam, & ita possumus perfundere vulnus. non sit hoc aqua & oleo, ne oleum cadat vulnere inimicum. In hoc tamen summa est diligentia obseruanda à Medico, ut mitis sit, quātum potest: non enim uites, non segetes; sed hominū membra tractat. Dixi oportere æqualitatem seruari, quoniam si dissimiliter coniungantur, & inæqualiter partes, succedunt rugosæ, & inæquales cicatrices: oportet ergo æqualitatem respicere, quæ consistit primū in superficie exteriori

exteriori, ita vt superficies unius partis respondeat alteri parti; & ita moneo, ne à medio vulneris confuere incipiat, hac ratione, quoniã nostri Chirurgici, vt fluxionem sanguinis inhi-beant, quæ est in medio vberior, semper à medio incipiunt: sed supprimendi artem habentes, quam ego docui; qua ablucere vulnera, & sanguinem detinere possumus; non faciatis hoc, sed futuram ab extremo incipiat. aliud pertinet ad totum vulnus, ad partes intimas, & extimas. Ego deuoucrem caput, si ex centum vulneribus duo confuuntur, & cor- respondeant partes inferiores superioribus, intima extimis. satis eis est, vt confuant, imò in fundo ponunt linamenta: sed oportet ut intima partes confuantur: ut si sint carnosæ, ego suo intimas, & profundas partes: sique hoc fuerit factum seruata æqualitate, hoc bene erit. Quartum caput est, ut postquam expurgauerimus, & adduxerimus labia, iuncta conseruemus saltem per spatium quatuor dierum in quo tempore non solum solum fieri agglutinatio, sed confirmatio etiam. si agglutinatio sit 24. horarum spatium, confirmatio sequetur in secundo die: si agglutinatio sit in secundo die confirmatio fiet in tertio; si agglutinatio in 3. confirmatio in 4. & non potest quartum diem ascendere, & transgredi. ista dicitur conseruatio unitatum partium.

Documentu

De deligatione. Cap. XXXI.



AE C autem variis modis fit, deligationibus, vel uinculis, glutinationibus, infibulationibus, futuris, & medicamentis: quinque hæc sunt recedente Medico, conseruantia vulnus: instrumenta, quibus fiunt hæc, primum sunt fasciæ, aut vincula. Secundum sunt acus & filum. Tertium sunt genera glutinis.

Quartum sunt emplastica medicamenta; addamus plumaceolum, quo conseruantur vulnera. & primum agamus de deligatione, quæ facilis est, & comoda, & ad eam recurramus, quum possumus, quia facilis est, & non torquet ægros. in hac deligatione oportet scire primum quomodo fieri potest. Secundò genera deligationum. Tertio materiam deligationum. Quarto quid agere possunt in vuleribus deligationes. Quintò quid obseruandum à Chirurgo in tractandis istis. Et primum quo ad naturam quæ à Gal. epidelis vocatur. Gal. vitur hac voce delis, quæ est ligatio carnis; epidelis, quæ est ligatio, quæ fit ab instrumento extrinseco: est etiam comprehensio, & collectio partium, quæ fit ab instrumento extrinseco apto ad colligationem. Genera uaria sunt; quoniam deligamus aliquando instru-

menta obuoluto unica deuolutione, & uocatur deligatio unius. aliâ facimus plurium: aliam simplicem, aliam compositam: simplicem uocamus quando omnes reuolutiones sunt eiusdem naturæ, ut quâ puer à nutricibus ligatur. quando autē uariamus, ita ut una sit unius, altera alterius generis composita uocatur. aliæ sunt rectæ, aliæ obliquæ; aliæ laxæ, aliæ arctæ: aliæ latæ, aliæ angustæ; aliæ æquales, aliæ inæquales; alię similes, aliæ dissimiles, ex his simul compositis ortæ sunt uarię deligationes. & primam fasciam uocamus; quam nemo ante me optimè nouit, & tantæ est utilitatis, ut ego in uulneribus crurium multos à morte liberarim. quoniam uulnera crurium sunt periculosa; non enim oportet, ut moueantur partes, & hanc ligaturam scēparnon etiam uocare solent. altera est, quæ umbo appellatur in uulneribus capitis, & faciei deseruiens. tertia uocatur oculus, quæ uitor in superioribus partibus, quarta species rhombus est, quæ etiam est in usu in capite. quinta in initimon, semisectâ ligationē uocant. sex tū genus est. Materia autem qua fiunt ligationes oportet, ut sit opportuna, & triplex à Gal. proponitur, altera est facta ex lino, ex canape. Secūda est lanea facta ex lana. Tertia est assumpta ab Hipp. fascia ex membranis, & cartis, qua usus est in uulneribus oculorum & narium. Verū addimus quartū ex codone bombace, cuius materiz habemus uincula opportunissima. quintum est sericina materia, quam setam appellamus. sunt aliqui, qui inueniēre genus opportunissimum, capiunt enim comam canapis, quæ pectinata est, & purgata à stuppa, postquam imposuēre medicamentum apponunt comā hanc supra uulnus; & ego aliquando in uulneribus crurium, & femorum usus sum coma ista. Sed oportet uos eligere materiam opportunam; nam non omnis fascia bona est: habentes enim filis crassiores in se, non sunt opportunæ. sed si uultis obseruare superstitionem meam in his fasciis: & possum uerè dicere, & testor Deum, cū uiderim hanc fasciationem penitus deperditam (quoniam omnes iam negligunt) nixus sum recuperare. omnes distortas partes his fasciis reduco per deligationes, ego his plurima feci in uulneribus. non est ergo superstitio. superstitio est illa eorum qui nolunt sumere ex camitiis, ubi minxerint mulieres. sunt aliquæ mulierculæ, quæ mihi quærenti fascias, dicunt, *Che non son miga di donne*. Ego rideo, & dico quòd de illis quæro. Opus est etiam habere rationem numeri, ut tot sint fasciæ, quot requiruntur; addatis secundo longitudinem. Tertio est puritas obseruanda: sed quum estis in bello, quando quis est uulneratus sumite eius camisiā à parte inferiori ad brachia usque ascenden-

do,

Materia.

Observanda
circa fascias

do, si oportuerit. Sed, si potestis cum hoc seruare munditiam, & puritatem, seruate. Quartò lenitas est adhibenda ut sint tenera, mollia, & æqualia ligamenta. Quintò est tenuitas, ut fasciæ sint tenues, ac triatæ, & consumptæ, non nouæ, & robustæ. Sextò addatis æqualitatem, in Hetruria utuntur fasciis, quæ sunt à principio largæ tendentes in acutiem in fine; oportet, ut sint in principio, medio, & fine æquales. Septimò ut sint simplices, ut non habeant filis inæquales. Octauò addatis integritatem, ut non sint fractæ. Nonò ut structura non sit uaria; sed eiusdem naturæ, uel uariæ naturæ, prout requiritur. Si uolumus robustissimas fascias, per rectum solemus scindere, idest per ductum staminis; si molles per ductum subtegminis; aliquando oportet, ut sint discissæ per obliquum; quando cupimus canalē in medio

De utilitate fasciarum. Cap. XXXII.



ddatis ad quē usum debemus parare deligationes. Tot nostri recentiores assumentes ab Auic. triplicem exponunt fasciarum usum: alterum incarnatiuum, & sic deligationem uocant incarnatiuam; alterum expulsiuum; & sic deligationem uocant expulsiuam. Tertium retentiuum, & deligationem uocant retentiuam; quia apponimus parti, quæ indiget retentione. Verum ex Gal. & Hipp. quartum addimus, quum nos uolumus seiungere partes coniunctas. Addamus quintum, qui dicitur usus directiuus, & fascia dirigens, intorta, siue directiua uocatur. Sextò quando uolumus prohibere abscessum ne fiat in uulnere, & uocatur prohibens abscessum. Septimò quum uolumus facere apostema, ut colligatur materia ipsa, & ista uocatur deligatio abscedere faciens. Vltimò quum sunt partes inæquales altera eleuata, altera depressa, fascia æquamus, erit æquans uocata. Ex his octo non omnibus indigemus in uulneribus, sed quatuor tantum. Primum incarnatiua illa, & est, quæ conseruat partes uulneratas, ut possint agglutinari, & hanc habentia labia coniungentem uocauit Hipp. secunda est illa, quæ retentiuua uocatur, quæ continens etiam solet appellari. tertia expulsiua, quarta, & ultima est, quæ prohibet abscessum.

4. Ga. lib. 9.



De incarnatiua dicamus prius, quæ dupliciter solet fieri: primò per fasciam duorum capitû, ita ut pars media stet in parte uulnerata, & duo capita coniungantur. si uulnus esset in interna parte brachij sumerem fasciam duorum cubitorum, & median partem applicarem exteriori parti brachii; & postea obuoluerem capita supra uulnus. Hæc dicitur fascia gemini principii: quia; posito medio fasciæ currunt capita fasciæ, & sicuti stringuntur capita stringitur uulnus. In qua aduertendum, ut non sit lata, ut latum est uulnus, nec longa, ut uulnus: nam cùm recurrunt ista capita, duplicatur fascia, & sic fit latior: & ideo, ne rugæ contrahantur, non debet esse lata uti uulnus, sed secundum tertiam partem uulneris minor, non debet esse lata per medietatem latitudinis uulneris, quoniam oportet, ut una pars semper super aliam cadat. Hicq; est potissimus usus deligationis. Cui secundus modus adiungitur, qui fit unico linteo, quod sit latius, quàm sit longum uulnus: quoniam medium parti sanæ apponimus, & applico ita, ut capita concurrant supra partem uulneratam, postea linteum suatur, ita ut futura transversa stringantur partes supra uulnus, qui modus nō est ita accommodatus ut primus, tamen si partes conseruet; oportet, ut dissuamus semper futuras, ergo quouies oportet uti, utamur primo modo faciliori.

De ligatione retentina. Cap. XXXIII.



Altera deligatio erat retentina facta ad retinendum ea quæ ponuntur supra uulnera ne cadant; & ista facit ad continenda splenia, medicamenta, stuppas, lineamina, & similia. Hæc solet fieri, uel unica, uel pluribus ligationibus, omnibus tamen laxis, ne constringat, nā efficeret aliud uel exprimeret, uel, &c.

De ligatione expulsiua. Cap. XXXV.



Expulsiua alia huic succedit; quum timeamus ne colligatur aliquid in uulneribus cauis, ista deligatio fit. Oportet, ut in omni exprimienda materia obseruetis duos terminos à quo, & ad quem. His etenim non ignoratis, deligationem sciatis. nam si à superioribus uultis exprimere, debetis à superiori incipere:

pere: sed hoc rarò accidit cùm semper materia declinet: ideo ab inferiori fienda: sed oportet deuincire exprimendo partem sanam, & senlim ab inferiori parte ueniendum ad uulnus, ubi sistendum. At pulcherrimum addit Guido, quòd ista deligatio debet fieri incipiendo ab inferiori parte sana ad uulnus. Cùm sumus in uulnere, ligetur una aut duabus ligationibus laxis, & postea sursum ascendat fascia ad partem sanam ut impediatur materia fluens, & ita eadem fascia, exprimemus materiam, & impediemus simul eiusdè fluxum.

De deligatione prohibente apostema. Cap. XXXVI.



Sus tertius deligationis est prohibens apostema, abscessum: quum adest dolor in uulnere, uel timemus, (quum adsit cachochimia, & abundantia malorum succorum) apostema; utimur deligatione incipiendo obuolutiones fasciæ supra uulnus; & postea ascendimus usque ad articulum ultimum, & partem sanam, uel usque ad primum, & sic prohibetur materia. His ergo speciebus deligationum habemus opus, ad agglutinandum, ad retinendum medicamenta, ad exprimendum, atque ad retinendum.

Quid debet obseruari in deligatione. Cap. XXXVII.



Erùm oportet quintum caput seruare; quid debet in deligatione obseruari. Primò respondet Hipp. ut citò agat omnia; & ex hoc exercitatum ab inexcitato chirurgo cognoscimus. Secundò, ut omnia faciat sine labore suo, & ægrotantis: nam sunt quidam ægri in lecto quos oportet deuincire; & id eo attollendum corpus sine labore, ne sanguinis fluxus succedat, uel deliquium animæ patiatur, & alia incommoda. Medicus etiam non laboret; sed ita se aptet, ut commodè omnia faciat. Hinc est, quòd paruus chirurgus oportet consideret an possit appropinquare parti; & si longus an possit curuari ad partes: laboriosi actus faciunt Medicum quiescere in medio actionis, & sic malum sequeretur. addit Hipp. ut expeditè faciamus. Chirurgi parant fascias ex conscissa tela; adsunt fila quædam, quæ excerpantur; his enim non remotis semper impedimentum deligationis aduenit; per expeditam ergo deligationem intelligit Hipp. ut fila remoueamus; nam semper obseruandum,

uandum, quum est aliquid obuinciendum decem obductionibus, si non est impedimentum æqualiter, & moderatè facimus: si sunt impedimenta adhibemus uim, & sic non possumus æqualiter obuincire; sed nimis strictè ligamus. Habeo exempla quotidiana: si quis eger decumbat, & uolo thoracem obuincire, si traicio sub eo fasciam dum iacet semper clamat, quoniã oportet inferre uim fasciis. Addit Hipp. ut deligationes non sint aliæ rugosæ, aliæ planæ; sed rithmus, & numerus, & proportio seruanda. Addite, ut quadrent fasciæ: trunco latæ, femori strictiores, brachio strictissimæ, digito multò magis angustæ conueniunt. non ergo semper utamur fasciis puerorum, ferè de nouo faciamus. Hæc pertinent ad fascias.

De plumaceolis. Cap. XXXVIII.



Ixi mus etiã non solùm fasciis conseruari partes, sed puluillis, plumaceolis dictis, qui ita dicuntur, quoniam ex pluma sunt: sed Antiqui non habebant usum hunc: sed quandoque lana, quandoque spongia; quandoque splenijs utebantur; quæ erant multiplicata multiplex repleta materia. Nostri autem utuntur his, & appellant nomine plumaceorum, & ita uocant omne inuolucrum ad seruandas partes opportunum. Materia est uaria nunc stappa, nunc linteamina inuoluta, nunc lana, nunc coctone, satis est quòd sit tumorosum. Sed figura multiplex, triangularis, quadrangularis, circularis & depressa, circularis, & rotunda.

De laqueationibus. Cap. XXXIX.



Ed hic usus conseruandæ partis unitæ non est similis: aliquæ sunt partes, in quibus fascias oportune nò possumus applicare, ut est in facie, in genis; oportet enim ægrum comedere, necesse est ergo conseruare partes. consutiones non sunt oportunæ in facie, quoniam faciunt nouas cicatrices; & ideò secundus modus est inuentus, quo laqueamus uulnera: præterea non omnes sunt constanti animo, & ideo nolunt consui, ut sunt Principes, & mulieres; idcirco ad laqueationem ueniendum, quæ est, quando quasdam telas applicamus, alteram in parte sana uulneris, alteram in alia parte uulneris opposita, & sic laqueis utimur; quia hoc modo

modo fit coniunctio partium; & dum contrahimus telam, contrahuntur partes. In hac applicatione tria obseruanda: primum preparatio telarum; secundum est instrumentum quo applicantur; tertium est modus: & primum semper deligetis duas portiones telæ robustæ, & ualidæ, æquales, non asperas, ne impendant agglutinationem. Secundò ut telæ in ea parte, quæ debet esse propinqua uulnere sint ita paratæ, ut filamenta nō cadant, consue, & complicate eas, ne cedant ligamentis; in altera parte, qua respiciunt partem sanam, faciatis, ut sint molles, & ueluti excerptæ, quoniam illæ multum faciunt ad applicationem, quum medicamentis detinentur. Si tela non esset fimbriata, forcipe secate, ut dilatare, ac duplicare possimus; nā sæpè in partibus inæqualibus oportet collocare has partes extremas respicientes partem sanam. Addatis primum, ut huiusmodi telæ secentur ad formam partis cui debent applicari: si pars sana triangularis, triangulares; si plana, planæ quadrangulares. Vt in uulnere genæ cum telam quadratam non possim ponere, ne cooperiat oculum pono triangularem distendentem usque ad tempus. Quartò notandum, pro unaquaque tela habeat ligamenta; quod est filum solidum, quo utimur ad uestes suendas; & oportet consue interiecto spatio unius digiti, ita ut filamenta tria, quatuor, quinque, uel plura uniti digiti spatio inter se distent. Verùm istæ telæ hoc modo preparatæ sunt apponendæ partibus, & hoc, quodam medicamento, quod gluten, alij collam uocant: igitur glutinoso corpore applicanda lintea. Quæ trium generum proponam uobis: nam bono existente glutine, gloriari debemus, quò robustissimè agglutinentur partes, & ab oleo non dissoluantur. Accipimus gluten piscium, uel taurinum, & soluimus aceto, & coquimus. Vtimur secundo commodiori. Accipimus puluerem tenuissimum & dissoluimus albo oui ad mellis consistentiam, & isto strigmento imbuimus telam. Puluis est: similaginis, idest floris farinæ triticæ, pulueris masticis, puluer. gypsi cocti, boli arm. orient. aloes, pulu. dragacanthi gum. arab. an. scrop. j. misce, & fiat puluis tenuissimus, quem albo oui imbuamus, & ad mellis consistentiam uulnere applicemus, sed, si sumus in uillis, solent conficere aliud genus glutinis, quod continuò secum ferunt; & est sicuti ceratum durum, igneliquefaciunt, & utuntur, & rec. pulu. mast. drach. 2. bitum. iudaici, curab. an. scrop. j. resinæ colophonæ drach. j. terenda terantur; in uase æneo cliquantur in igne, & componatur gluten; si est durum infundat unam uel alteram guttam olei rosæ. sed absque eo facit effectū. Ego uerò (quum possum) non utor istis nec

primo, nec secundo, nec tertio: ego usu habeo gluten tenuissimum & simplicissimum. accipio album oui, & contundo diligentissimè, quo inficio patinam stagneam hoc albo oui, & pariter telam: postea calcem uiuam non extinctam capio, & aliquantisper inspergo super patinam, ita ut uix appareat; postremò super patinam appono telam, & hoc modo aliquantisper comprimo, ut pulvis hæreat telæ, & hæc superat omnes alias parationes glutinum, quoniam tenacissimè hæret. Et dum inspergo puluerem, si copiosus uidetur, bucca sufflo. Et hæc agglutinatio madefacta non tollitur, & superat omne gluten. In applicatione uidete ne tangant uulnus telæ, & distent à uulnere.

De futuris.

Cap.



In uulneretur particula aliqua corporis humani docet methodus hæc, ut disperatum uniatur, & hoc duplici ratione, (ut ait Galenus) aut per primum scopum, quæ agglutinatio dicitur, aut per secundum, quando medio quodam coniunguntur partes, & hæc est caro, & sifarcosis, & scopus secundus dicitur: prior autem scopus, à natura obtineri solet; quando partes molles sunt separata. Non faciet autem hoc natura, nisi optimè expurgetur uulnus excremento repletum. Si uerò sit purum, nihil fiet, nisi in tali dispositione conseruetur: tertio oportet, ut coniungantur partes, & conseruentur coniunctæ: opus naturæ est agglutinatio: coniunctio est opus Medici, & instrumenti; & hoc aliqua ex parte dictum, aliqua ex parte dicendum est: dictum est de ligaturis, & glutinibus, tertium relictum erat futura. De futuris igitur tractemus: in quibus quatuor seruanda: primum, ut uideamus, quid sit sutura; secundum, quot sunt genera futurarum; tertium quibus instrumentis, & qua materia consueundum: quartum quid obseruare debet Medicus, quando fuit. Et primum explicemus, quid per futuram intelligamus. Per futuram intelligimus compositionem in partibus corporis humani, quæ fit medio filo, & aut in modum futuræ pannorum, quia aliquando ita copulantur filo, & acu, uti panni, & ideo compaginationem hanc futuram uocamus. Huius compaginationis plura sunt genera: primum est, quod ex toto respondet confutioni pannorum: reuocante in memoriam futuram tunicæ, ubi sutor ab una parte incipiendo sensim, & sensim continuando procedit usque ad extremum, & illa continuata futura dicitur; ita nos in uulnere nunquam resecdo filo, sed

Quid futu-
ra.

Quot gene-
ra.

sed integra manente fuimus uulnus integrum. Et hæc uia non est perpetua: hac nō semper utimur. Sed in illis uulneribus, in quibus tenue corpus suendum, ut cutis ut quando glandulam cancerosam extrahimus, consuimus intestina, quæ constant tenui tunica: præterea quando secamus uaricem, uel arteriam utimur hac. Et ideo hæc est norma communis, quum tantum corium suendum, si est uulnus longum, huiusmodi utamur consutione; hæc est prima consutionis species, quæ dicitur uerè futura. Alia est futura, in qua quamuis pluries perforemus labia uulneris, & pluries traiciamus acum, tamen non est unica futura: quoniam acceptis capitibus fili traiectione non perforamus rursus, sed alligamus capita, & addimus nodum, & secamus; & tunc iterum perforamus uulnus, & similiter faciemus secundò, & tertio, in alio, & alio loco &c. Hæc habet nomen puncti, punctationis, quoniam facta perforatione colligimus extrema fili, quæ nodamus. Hæc numeratur inter species futuræ à Gal. 6. meth. 4. & uocatur à Cels. lib. 5. cap. 26. fibula & anctir à Græcis ipsis. anctir enim Græcè, Latine fibula est. Vocatur fibula quoniam sicut in fibulandis caligis ueluti ansa quadam colligimus cingulum, ita in uulneribus. Sed not. hoc, quòd omnes Medici sentiunt aliter, & aliter intelligunt. Guido per fibulam intelligit instrumentum quoddam, quod habet geminum hamum in extremo utroque. Videte tōsores pannorū lancorum habent scamnum, supra quod extendunt pannum, & habent instrumenta hamata, quibus extendunt pannum, quem scamno iungunt mediantibus his instrumentis, alter enim hamus panno, alter scamno hæret. Hæc instrumenta uocantur à Guidone fibule, & à Recentioribus omnibus; nam si in aliqua parte esset uulnus, hoc instrumento cōiungerem labia. Ioan. Tag. in suo opere quod fecit assumpta materia à Guidone intelligit hoc instrumentum, uel zneum, uel calibeū. Additur autoritas Ioan. Cornarij in literis Græcis exercitati, qui in com. in 2. Gal. de comp. med. loc. dicit fibulas esse hamos uel zneos, uel calibeos. Ex quo, ab his falsa uidetur sequi mea opinio, quæ dicit, quum suuntur uulnera per interualla dicitur per fibulas. Vnde notate quòd fibula, quæ anctir à Græcis dicitur, apud Latinos plura notat. Aliquando enim intelligimus quoddam instrumentum zneum, quo pueri antiqui prætextam iungere solebant, uel caligas, uel huiusmodi indumenta, quæ penitus respondet nostræ fibulæ quam uariis nominibus uocant in Italia. Patauini scoua. & hæc est fibula antiquorum, & hac fibula cingulum, & corrigias iungere solemus sed effigies Antiquorū differt à nostra, prout est uidere in mar-

moribus, & picturis. Præterea per fibulam anulum quendam intelligebant, quo præputium colligere solebant, ut uix egredi lotium posset. Antiqui enim solebant seruare molliciem in puerulis, ac etiam uocem, quæ humido seruari solet: humido absumpto deturpatur: & ideo ne pueri uel tractantes penem, uel habentes rem cum muliculis semen mittendo humidum deperdentes molliciem deperderent præputia fibulabant. Et tradit modum Cels. quo possumus infibulare pudendum & docet modum perforandi, & filo seruabat donec fieret foramen, & remaneret. Hoc habet Martialis lib. 9. epigr. ad Crestum. Hæc erat secunda fibula Antiquorum. Apud Medicos etiam erat tertia fibula, quæ nihil aliud erat nisi filum perforans partes nodo collectâ, & hæc est futura, de qua loquor, ideo Antiqui non respexerunt ad hanc tertiam fibulam, & non poterant credere, quod esset futura: & mouentur authoritate Gal. dicentis labia vulneris iungenda uel deligatione, uel futura, uel fibulis: per istam ergo distinctionem elocutionem Gal. arguit fibulam distinctam à futura; præsertim cum adiungat hoc uerbum [uel omnibus simul.] Verum dico ego, quod per deligationem intelligit Gal. illud, quod diximus factum uinculis, & fasciis. Per futuram intelligit primam futuram, per fibulam uero hanc ultimam secundam futuram quæ non est uerè exactè futura, ut prior: legite Celsum loco dicto ubi manifestissimè dum loquitur de futura, loquitur de fibulatione, ubi facit utranque filo, quam uocat acciam: & eandem Auic. appellat secundam infibulationem uinculum factum ex filo: præterea in facienda infibulatione requiritur, ut accia sit tenuis, & non nimis torta; & omnia præcepta, quæ tradit in futura, tradit in infibulatione, ergo, &c. Addatis secundò, quod non obseruauerunt locum Gal. in 2. de comp. med. loc. cap. de plaga, uel contusione ex Archig. ubi dicit, quod si plaga fuerit cum uulnere pericranei statim deradatis os, deinde coniungetis fibulis labia vulneris, postea dicit, Si futura non potest conseruare labia, debemus curare uulnus eo modo, quo uulnera hiancia seruamus; ecce quomodo fibulas, futuras uocat; in eo igitur loco fibula, & futura idem sunt. Tertio non obseruauerunt quanta diligentia Gal. præcipit, ut in suendis uulneribus non excitemus dolorem, quæramus filum molle, delicatum &c. Si hoc est: si hamos ponemus ferreos, nonne excitabitur maximus dolor? ergo fibula non est instrumentum nostrum. Quarto addatis: quando Gal. uult hæc tria futuram, fibulationem, & deligationem simul fieri nonne erit cruciatus intollerabilis? in uulnere enim aliquando quinque, & sex hamis indigemus; & ideo seopus

lib. 7. c. 23.

3. meth. 4.

6. meth. 4.

pus indolorositas erit sublatas, quę proponit Gal. ergo infibulatio est illud, quod uulgò, pūcta uocamus, & illa potest aptari cum prima sutura, cum deligationibus, & uidete hoc, & obseruate, quia omnes errarunt in hac materia. Tertia species futurę: solebant Antiqui alio modo fuere, ut faciunt fœminę, quando emendant: quum casu pallium scholaris disrumpitur, nostrę mulieres solent consuere, & suturam illam demendationem uocant, quia faciunt suturam latentem, quę percurrit ab uno latere ad aliud & filum non egreditur unquā supra pannum ita aliquando consuunt nostri Medici. Hoc genus docet Gal. 3. meth. & in illo loco. 6. talis confutio fit in abdomine; quoniam in abdomine habemus pinguedinem, & facilitatem substantiæ. Vltimò uos uidistis futores caligarum, qui perforant utrumque coricem, postea habent geminum filum, in cuius extremo duplex secta adest. Albuc. docet hunc modum suendi, & ista erit quartum confutionis genus.

3. Species suturæ.

4. Species.

lib. 2. c. 8. §

De usu suturarum. Cap. XLI.



QUATUOR illis generibus suturarum coniungunt Medici vulnera, non vnum tantum ad usum, scilicet, ut possint agglutinari partes diuisę: sed dum consuunt vulnera, vel ad incarnandum, vel ad retinendum, vel ad supprimendum sanguinem. Semper ad ista tria futura inseruiet. Si ob agglutinationem fiet, incarnatiua dicitur, & hæc summa cum diligentia fit, & magis stricte sumuntur partes. Alia est seruatiua, uel retentiuu dicta, quando consuunt, non ut agglutinentur, sed ne nimis hient, ne nimis dilataentur, volunt in termino mediocri seruare: non nimis hiet, ne refrigerentur partes; non nimis stricte sunt disperati agglutinatione. Tertiā appellant suturam suppressiuam, & hæc est, ut sanguinem supprimamus, cum secatur vena vel arteria: consuimus aliquando ad supprimendum sanguinem: ista restrictiuu vel suppressiuu dicitur, tamen istę tres species, quę nascuntur ratione vsus, possunt esse in quolibet quatuor generum suturarum.

Acu.



OST hæc genera futurarum succedit materia: & primò acus optimè instructos habeat Medicus. Et primò longitudo trium digitorum per trāsuerfum est oportuna, vel aliquādo quatuor digitorum, nec debent esse tenues, nec crassi; quoniam cūm oportet filum imponere crassum, si tenues sunt, non possunt pertransire, & cruciant ægrum: sint politī, acies sit triquetra aut quadrangula, vel saltem gemina, quæ facilius possit penetrare. Damasco Venetias delatos habeatis: qui ex ciuitate Mediolanensi afferuntur, mali sunt, quia non sunt expoliti: sunt etiā malæ temperatæ materiæ, & dubium est ne aliquando acies in vulnere rumpatur: materia sit duorum generum. Oportet habere caliberos pro suendis partibus duris: oportet habere argenteos duriores, vt possimus flectere: calibei enim non ita torquentur, quum enim partes cauas sue-re debemus, nisi habeamus acus intortos, & qui flecti possint, nihil eficiemus, vt in palpebris: sed notate vt fiāt malleo, non lima, vt contundatur argētum; etenim ita sit solidum & durum, ac si esset calibis. Numerus etiam requiritur, vt non habeat minister vester vnum acū: si oportet facere plures fibulas, nō eodem acu fiendæ: quoniam quū filum sanguine erit tinctum, durefcit, & sic dolorem parit. In Rusticis non obseruanda hæc, sed in delicatis corporibus. Præterea oportet conseruare, nam si custodiam non habetis, fiunt rubiginosi, venenosi, & non curunt: conseruentur in fistula argentea inuncti oleo: & notate quòd Medici solent facere hoc, quòd obuoluunt filum sanguineum: & nesciunt quòd dicit Plinius, quòd sanguis humanus sumit pœnas à calibe, & rubiginem excitat.

De fistula argentea. Cap. XLIII.



PVS est etiam habere fistulam argenteam, vel alterius materiæ, in quam iniiciamus acum; quoniam si suenda palpebra, vbi digitum non possem ponere, fistula vterer, in quam aciem acus intorti iniicerem, ideo hæc non solum acus seruabit, sed auxiliabitur in hoc.



Sic etiam materia filū, & accia dicta à Celfo: oportet vt sit robustum filum, secūdō non nimis crassum aut durum; quia asperitate dolorem faceret: crassities impediret facilem transitum. Præterea non habeat nodos interpositos, nec sit putrescibile: quoniā aliquando oportet per decem dies seruare: crucian-

Lib. 5. c. 26.

tur vulnerati à repetitis consutionibus: quare nec fila lanca, nec ex bombace oportuna sunt, quia facilè frāguuntur & putrescunt. Gal. quū loqueretur de illaqueatione arteriarum & venarum, quærens filum, quod solidum esset, & non facilè marcescat, dicebat qd filū gaetanum, quod ex Galliis afferebatur, erat oportunum. Et huius copia nō aderat: sericinum apud Romanas matronas inuentū quærebat: nos sumamus filum factū ex lino Brix:ēsi: vel recurramus ad sericinā materiā, quæ præstātilissima est, quia non facilè marcescit, sed sit candidum filū, non infectū colore: sed nō potestis habere oportuniorē rubro cremesino, quia adest materia illa rubra, quæ adstringit, & exiccat, & magis adiuventi, quā damni adfert. Cauete à nigro, inficiente, erodente, & mordicante vulnera. Albucasis lib. 2. cap. 14. meminit capitum formicarum in suendis intestinis, quoniam aperiant rostrum, & tunc appositæ stringunt, & secantur corpora earū: ego nondum usus sum, quoniam nō habemus formicas tam magnas & si haberem non uterer. quia si habemus filum & possumus abstrahere, quid relinquere ibi capita illa? Præterea Albuc. docet ut suamus filo intestini animalium recentium; hoc improbo, si enim subito debemus suere non habebimus ouem paratam, ut mandemus interficiendam ut inde fila habeamus. Præterea Medici solent consuere acubus sine filo, ut colligant partes tantū, non ut suant sicut sartores, qui imponunt birreto acum, quem extremis partibus obuoluunt filo ne cadat, ita suūt Medici nostri: sed dolorosus usus, & malus, quoniā acus durus est. Alii ut uideantur acutiores (miror equidē) accipiunt pennam duplicem uel triplicem, & scitis quōd in penna est medium durum solidum quod uocant hastam: sunt etiam pillulæ laterales quas tollunt, & restat hastula, tunc partem subtiliorem insigunt acui, & illo perforant uulnus; & tribus, aut quatuor hastis illis firmant labia, & suunt, addunt modum alium, quando filum non oportet secare labia accipiunt stuppam, & faciunt ueluti linamentum, & appellant canulata; postea accipiunt acum habentem geminum fi-

13. Met. ult.

Capita formicarum.

lum

lum & utrunque perforant, aperiunt filum, & canulam apponunt. quando uolumus sucre abdomen, ita ut filum non maneat supra vulnus, hæc sutio utilis est,

Documenta circa suturas.

Cap. XLV.



N consuendis vulneribus hoc erat ultimum, ut ea ratione ageret Medicus, quæ præstans sit, & oportuna, ut blandè, & molliter agat, nec acerbè consuât, præterea oportet, ut moderatè stringat: nam si nimis stringeret fieret tumor: tertio oportet, ut ita suantur vulnera, ne nodi dissoluantur, multa enim pœna afficiuntur miseri ægri, quum oportet resuere. deinde oportet consuere ne tãgât cordas aut neruos subiectos, præterea aduertat ne consuât ligamenta: non quia faciant dolorem ligamenta consuta, sed quia non agglutinantur, ideo in uanum conuimus: quare incon suta linquenda sunt. Vltimò nota, quòd omnes partes ipsius corporis possunt accipere consutionem: nam sunt aliqui, qui authoritate Pauli nolunt, ut articulorum uulnera & neruorum suantur. Paulus non intelligit hoc, sed uult, ut substantia neruosa non suatur, sed corium suprapositum suendum: nam in omni uulnere semper suatis cutim suprapositam, non partes neruosas subiectas: nam si fuetis corium suprapositum dabitis indumentum partibus neruosis, & ita fouebuntur, non infrigidabuntur, & etiam fiet digestio pura: hoc etiam facite in uulneribus ossium, & si partes caue sui non possunt, oportet enim ut caro concresecat, suite & apponite linamētū, quo materia effluere possit: in cõsutione præterea obseruet minister uester, ut nō accipiat paruam quantitatem labii, ita quòd prope uulneris labium minimam partem capiat, neque adeò magnam quantitatem, nam nimis propinqua secat partes, unde uidebitis cicatrices factas, ex transuerso cicatricis magnæ: debemus arripere labium per spatium digiti minoris. Spatium uerò, quo debent distare fibulæ sit unius digiti uel minimi, uel indicis: dixi minimi in his, qui crassas manus habent: nimis distantes offendunt, quia non bene uniuntur; nimis propinquæ offendunt, quia dolorem inferunt ægris: sed quum carnosum vulnus fuitur, non oportet corium solum, sed intimam carnem, saltem ad mediam profunditatem perforare: itaque arripietis carnem spatio digiti minoris: & fuetis. Vltimum præceptum tradit Hipp. in lib. de Vlcerebus, ut obseruemus an uulnera sint in arctubus extremis

mis, quoniam tunc efficiendum, ut plurimus sanguis excernatur: si autem fuerit in abdomine non est tutum emittere multum sanguinem: qua ratione? respondet, quoniam tunc sicciora sunt vulnera, & ideo facilius sanantur. Sed quæret quis si sano simile est siccum cur non est educendus sanguis in abdomine, sicut in brachiis? hæc est causa, quoniam arctus facilius tentantur à fluxione, quam ventres, quibus uiget calor naturalis, & ideo oportet, ut brachia, & arctus ualide stringantur, & siccetur, quia maior est arctui imbecillitas: addatis aliâ rationem, quod per euacuationem sanguinis siccatur pars: siccatio autem indicatur, sed magis ab una, quam ab alia parte. In partibus naturaliter siccis semper medicamenta siccissima ponuntur: quin uerò imponuntur sicca medicamenta locis humidis, sicca media imponuntur: sed cum brachia, & arctus siccissima sint, ideo per emissum sanguinem multâ exiccationem facere debemus: ventres autem humidi sunt, ideo pauca sanguinis quantitas emittenda: præterea multus sanguis in arctibus suffocat naturam eius, quoniam calor arctus imbecillus est. sed si in abdomine multum sanguinis aufertur, aufertur pabulum caloris naturalis, qui calor ingens, & ualens in abdomine. His rationibus possumus unire uulnus, & quamuis deligationibus, futuris, & glutine hoc faciamus, tamen utimur medicamentis, quæ habent uim emplasticâ, & quia hoc rarissimè fit ideo omittimus.

Partis temperiem seruandam.

Cap. XLVI.



Ultimum caput est, ut temperiem partis affectæ seruemus, quia (ut dicit Galenus) temperies loci habet rationem causæ futurorum, id est ipsa est, quæ illud agit, quod nos tentamus agglutinare, unire, facultas facit hoc, quæ pendet à natura, & temperatura partis: conseruatur natura conseruata temperie.

J. Meth. 9.

vulneratur manus: quomodo seruatur temperies? quid est temperies? respondet Hipp. in lib. de Vlcenibus, siccum sano propinquum, humidum non sano. Hæc est temperies partis, siccitas. Videtur monstrum merum dictum Hipp. quid de caliditate, & frigiditate, non ne has seruare debemus, quæ cum sint qualitates agentes, siccitas qualitas est patiens semper? Diuinus ille senex ita dixit, quoniam sicco seruato, seruantur omnes temperaturæ. quum seruatur siccum, semper caliditas, & frigiditas seruatur: nam à gladio non datur occasio nec frigiditatis, nec caliditatis corruptæ. sed siccitatis maxima est occasio statim excitato dolore, vulnerata parte, fluit humor copiosus, quæ fa

cit, ut ferueat humor, putrescat, & corrumpat calorem: uel concre-
 scat, & congeletur, & sic frigiditas & caliditas partis corrumpuntur:
 meritò igitur tantum mentionem fecit siccitatis, quia laborante ip-
 sa, augetur frigiditas, uel caliditas: oportet ergo conseruare partes
 in sua naturali siccitate, quibus seruatis nec frigiditas intèdètur, nec
 caliditas corrumpitur: caliditas enim & frigiditas non habent propo-
 sitam occasionem à gladio, & instrumento, sed à laborante siccitate.
 Hanc siccitatem uariis modis seruare possumus, & præcipuè medica-
 mentis: imponenda medicamenta talia, quæ cōseruent siccitatē istā.

*Quomodo inueniuntur medicamenta conseruantia
 siccitatem. Cap. XLVII.*



Ed quomodo inueniam medicamenta hæc quæ hoc
 faciunt? ad inueniendā hæc medicamenta, debetis
 in memoriam reuocare, quòd obseruandum est tem-
 peramentum corporis uulnerati: quod dupliciter
 consideratur, uel corporis uniuersi, uel particularū
 singularum, aliud est unum, aliud alterum. Corporis
 temperamentum seruandum an equale in specie, an inæquale, nam
 species humana habet temperamentum inclinans ad humiditatem,
 & tamen temperatum est non ad libram, sed quia constituitur pro
 norma agendorum pro illa specie: sed si referatur ad animalia humi-
 dum est. Hoc est primum temperamentū speciei humanæ, quia repe-
 ritur in maiori numero hominum, quoniam scēminæ, pueri, & adole-
 scentes habent: aliud est temperamentum acquisitum, quod solet cō-
 sequi ætatem, ut senum: quod solet consequi exercitationes, ut rusti-
 corum: quod solet consequi regiones, ut habitantium calidissimas
 oras. Hæc enim uel frigida, & sicca sunt, uel calida, & sicca. Præter-
 eā debemus seruare temperamenta partium, quæ omnes propriam
 habent temperaturam, quæ postea faciunt, ut resultet naturalis tem-
 peries. Quærendum ergo an partium temperaturæ respondeant tem-
 peraturæ uniuersi? si in scēmina genam, & pupillam capiamus, dico q
 sunt illiusmet temperaturæ, qua temperata est tota species ueluti ui-
 demus, si accipiamus genam senis, uel partē carnosam: dico, quòd
 sunt eius temperaturæ, qua totum simul constat, sic in Aethiope etiā
 & uillico, dico quòd illæ partes sunt eiusdem habitus. Aliquando
 sunt partes sicciore uniuerso habitu, ueluti genu puerorum siccius
 est: digiti scēminarum sicciore sunt uniuerso corpore. Hoc consti-
 tuto

tuto, habeo fœminam uulneratam, uolo seruare siccitatem partis, ne humectetur, quod indicabit mihi oportunum medicamentum? statim confugio ad temperamentum uniuersum: & dico esse temperatâ ratione speciei, sed in se in humiditatem inclinât: respicio ad partē & dico, Et illa pars, ut gena in se respondet habitui totius, ergo ista inclinât paulisper ad humiditatem, & caliditatem, ergo medicamenta leniter siccantia requiruntur, quia in isto excessus non est ualde præter naturam si est humectata passa est ab affectu simili naturæ suæ. Sed in parte sicca si humectetur indicatur excessus inultus, qui oppositionem multam indicat, ideo imponâ in uulnere puellæ siccans quiddē, sed in primo gradu materia hæc erit farina hordei, crocus, thus, fursur frumenti, farina fabarum, chamomelum, eupatorium, adiantum, farina orizæ & similia, quæ non excedunt siccitatem in primo gradu. sed si uulneratus sit, cuius habitus totus siccior sit, uel uulnerata pars respōdens huic habitui, statim recurro, & dico, Hæc pars natura sua sicca est: si non est humectata oportet habere ualens siccum: quoniam tale requiritur in præseruatione, quale in fugatione unius contrarii: ut si excessus magnus siccitatis, excessus magnus debet obseruari in præseruatione. si ego habeo corpus calidum, & humidū & timeo ne humectetur magis, requiritur siccum unius gradus: sed in præseruando corpus siccum ab humiditate debemus uti sicco in secundo gradu: in rusticis igitur, in senibus, in uiris habentibus habitum calidiorē, & sicciorē, si uultis seruare habitum, utimini siccis in secundo, quoniam hæc conuenirēt uniuerso habitui: quæritur etiâ sicca in secundo gradu, quum puer uulneratur in articulo, uel neruo, sed in sepe oportet deuenire ad siccantia in tertio. Respektu ergo habitus communis, uel partis respondentis habitui communi, si erit uulnus applicate sicca in primo: rursus in uulnere respectu habitus uniuersus, qui siccior sit, utemur siccis in secundo: si sit pars siccior utemur siccis in tertio gradu.

De alio usu medicamentorum siccantium. Cap. XLVIII.



Erū cū imponimus medicamenta siccantia, non solum seruāt, ut humidior reddatur pars, sed oportet etiam, ut iuuent. uult natura iungere partes, in quibus est humiditas: quæ quum iuxta ponuntur, illa humiditas ultro citroque labitur, & sic spiritus defluit, illa humiditas siccatur, quæ est, uti gluten quū

concreſcit, & ſic colligat partes. Quis eſt effector ut concreſcat ſubſtantia? Natura, & nos ſeruantes ſiccitatem ne humiditas impedi-
 at. Medicamenta auxiliantur, quia faciunt ſiccitatem, ut ſubſtan-
 tia ſiccior & tenacior fiat. ergo non ſolùm ſiccitas requiritur, ne hu-
 midum ueniat, ſed etiam, ut auxilietur agglutinationi. Verùm oportet
 obſeruare partis ſiccitatem, quia ſemper paulùm debet eſſe me-
 dicamentũ ſiccior, & ita in mollioribus erit ſiccũ in primo acceden-
 te ad ſecundum, in ſecundo genere erit ſiccum in ſecundo proce-
 dẽte ad tertium: in durioribus erit in tertio procedente ad quartum.
 Debetis etiam ſcire, quòd quamuis multa agamus, ne ſanguis fluat,
 tamen ſemper fluit, nec ita ualidum eſt medicamẽtum, ut ſiccet ſan-
 guinem: non ſolùm ergo medicamentum debet ſiccare, ſed impedi-
 re ſanguinem, & hoc fiet, ſi habebit facultatem adſtringentẽ, conſti-
 pantẽ, & ſic efficiet, ut tantũ materiæ fluat, quantũ neceſſe eſt: quũ
 ergo inuenietis apud Gal. medicamenta glutinatoria debetis intel-
 ligere ut reſpondeant ſiccitati partis, & adſtringant, quod enim
 appellatur; quia imponitur uulneribus recenter factis, ut aggluti-
 nentur. Glutinatio ergo fit à natura partium diuiſarum: fit autem
 quia humiditas partium glutinat partes; uertitur enim in ſpeciem
 collæ. Hoc autem facit natura adiuta à Medico, non manu, ſed medi-
 camento impoſito; & hoc duabus rationibus, aut ſeruata ſiccitate,
 aut humiditate remota: ſeruatur ſiccitas, quia humiditate adueniẽte
 corrumpuntur partes: oportet ergo ſiccantia medicamenta impo-
 nere: iſta indicantur à qualitate ſubiectarum partium: ſi erit particu-
 la ſiccior temperie ſpeciei erunt imponenda ſiccantia in principio
 ſecundi gradus: ſi adhuc ſiccior imponenda medicamenta ſicca in
 ſecundo, ſi ſicciffima in tertio gradu incipiente. Aliud adhuc adiu-
 mentum requirit natura, quia fluit multus ſanguis in uulnera, opus
 eſt, ut impediatur, & hoc fiet ſi medicamentum erit adſtringens, ſti-
 pans poros: iſta igitur indicabantur qualitates medicamentorum,
 quæ glutinatoria dicuntur; quoniam iuuant naturam agglutinantẽ.
 Cruenta etiam ſolent uocari, quoniam ſtatim cruentis uulneribus
 imponuntur: eſt differentia inter ſarcotica, & glutinantia medica-
 menta: nam ſarcotica, id eſt carnem facientia ſatis habent, ſi conſer-
 uent naturam partis; & ideo ſatis eſt, ſi in molli habitu erunt ſicca
 in primo gradu; ſi in duro in ſecundo &c. nec oportet, ut ſint adſtrin-
 gentia, ſed potius, ut aperiant, & præbeant uiam ſanguini aduenien-
 tiſ: ſed glutinantia oportet eſſe adſtringentia.

Epilogus.

*Aqua frigida, oleum, linteola pura benedicta, & album oui
improbatur. Cap. XLIX.*



I, qui utuntur aqua frigida benedicta, oleo benedicto, linteolis puris benedictis, uel albo oui, errant. Tota Hetruria, in locis Aprutij, & Neapolitano regno sunt, qui tentent agglutinationem huiusmodi rebus benedictis & ratione successus, & benedictionis, & ratione autoritatis Celsi uolunt istam esse

lib. 3. c. 26.

methodicam curationem. Nā Celsus inquit, Licetq; sine peregrinis, & compositis, & conquisitis medicamentis uulnus curare, imposita spongia, uel linteo ex aqua frigida: ex quo licet aqua frigida agglutinare, & sanare uulnera: quoniam cum opus agglutinationis sit naturæ, Medicus adiuuat eam impediendo ne fluat humiditas, & seruetur siccitas. Sed aqua frigida repellit fluentem materiam, & si præter modum humectata, restituitur. Additur ab illis autoritas: nam habent cationem factam ex uerbis diuinis, quam nulli communicare uolunt: cui benedictioni tantum hærent, ut dicant quod inuocato nomine Dei solum, fieri potest, quoniam luto Apostoli sanabant oculos, & qui fidem habuerint (dicit CHRISTVS) maiora ijs facient. Non credo id esse tutum: succedit quandoque proculdubio, & ego testor: sed idem dico, quod de curatione Empiricorum. nullus tonsor est, qui non sanet uulnus, non quia sciunt sanare, sed quia natura niserta nostræ ignorantie facit, quod facere deberet Medicus. Multoties uocatus uidi medicamenta opposita: quod methodus sit opposita, clarum est, experientia clara est. Ego uidi sanata uulnera, sed casu, non ratione. Quum irem Romam quidam seruus erat super equum nolentem procedere, & nescio quomodo infixus est gladius cuiusdam Romani pedi serui, ita q; quasi erat truncus pes: ego accepi aquam, & non benedixi: & quia eramus in itinere erant sectæ cordæ, curauim aqua manè, & serò abluendo, & sanatus est dum accessimus Romam: repellendo ergo aqua sanat: sed non est tutus usus, dato quod in corpore non sit plenitudo, non dolor, non fluxus materię: nulla est uis adstringens aquæ, nisi dum frigida est: quum calida est, id non præstat, ideo non est tuta. Ad autoritatem Celsi respondendo, quod id proponit Celsus in leuissimis uulneribus, quæ etiã sanarentur per se, in quibus non est digna cura diligens cum leuissima sint. Ad benedictionem dicite, bona uerba bona sunt, mala uerò mala: sed bonam aquam non faciunt: non nego uim inesse fidei: at Diabo-

Diabolus deludit nos istis experimentis. Ad experimenta: ego non adduco; quoniam solēt Empirici facere clenchos eorum, quos sanāt: uellem, ut facerent eorum, quos interficiunt: uulgus facit clenchos eorum, qui occiduntur à Medicis. Medici eorum, quos sanant. Periculosum ex æquo est medicamentum aquæ: quoniam gangrenæ sæpe fiunt, ut ego uidi in curia Principis Salerni huc uenientis, ubi erat quidam sanans hoc pacto: frigidum est inimicum uulneribus, frigidissimum interpretabatur Gal. in lib. Hipp. Multò minus audiendi sunt illi qui oleo sanant cum humidum sit, & humiditatem conseruet: hoc medicamentum aduersum est penitus. Superioribus annis plurimi erant, qui hoc modo sanabant; sed postea cum infinita damna intulissent, necessariam fuit dimittere; quia ex toto oleum contrarium uulneri: impedit enim agglutinationem ut dicebat Gal. & nos suprā: aliqui linteolis utuntur, quibus non usæ sint mulieres, & postea benedicunt, & sic purissimis utuntur: quo ad usum linteolorum mundorum, bonus est usus: sed potest siccare superficiem, non intimam partem uulneris, quia non penetrant: si contunderent, ita ut penetraret, possem hoc credere: quare in uulneribus alicuius momenti uanus est usus. Est Guido, & Rasis, qui utuntur albo oui concusso in uulnere, & sic prima, secunda, & tertia, & quarta die, donec agglutinetur uulnus: aliqui puluere mastice utuntur: quæ ratio medendi non placet; quia in hoc medicamento non adsunt omnia necessaria requisita: quoniam in mastice licet adstringens aliquid sit, ut robor possit dare partibus: tamen uis adstringens non est ualens, præterea si ouo admiscetur, à Gal. aduertimur, ut quod in uulneribus imponitur, in tenuem substantiam redigatur, ut penetret, sed ille puluis albo oui colligitur, & sic non potest penetrare. Et quamuis Auic. uelit album oui humectare, ego dico siccare, & frigefacere, tamen cum non adsit uis adstringens, quæ requiritur, ideo non est opportunum medicamentum: potest siccare: hoc album oui non penetrat in profundum, statim siccatur, & ideo dico quod non est opportunum album oui, & puluis mastice. Tu uteris in principio albo oui, dicet aliquis, Nos utimur, quoniam non habemus semper opportunum medicamentum, confugimus ad ea, quæ sunt paratu facilia; & utimur prima die ad suppressendum sanguinem, & ideo opus est habere glutinosum, tenax, refrigerans. Sed ego continuo mando, ut madefaciant uino ne siccetur album oui; quia nimis siccatur & sæpe inflammationis causa est: non utimur autem semper ad agglutinationem: dimissis itaque istis nos inquiremus medicamenta opportuna serua-

to Galeni præcepto, ut omnia medicamenta habeant tenuitatē substantiæ, & ut nos saltem talem tenuitatem tribuamus, aut contundendo, aut eliquando, aut commiscendo cum penetrantibus: nam si cerussam integram, uel lithargirum ponemus non contusum, nihil proderit: sed, si contudemus, multum adiuventi afferemus.

De medicamentis agglutinantibus opportunis. Cap. L.



Um omnis ratio imponendorum medicamentorum vulneribus agglutinandis, præter illam, quæ monet siccantia, & adstringentia medicamenta imponere, mala sit, nos colligemus semper talia medicamenta dicta imponenda esse, & quum dico adstringens gustu intelligo, ut si medicamentum ore sumamus, adstringēs sit, & ita per se erunt adstringentia, siccantia, & hæc trium generum sunt, aut liquores, & isti tenuitate substantiæ apti sunt, quoniam non habentes terminum facillè intrant cauas, & meatus aliorum corporum: sed est incommodum; quoniam facillè siccantur & dissoluuntur, quia non habent substantiam resistentem: undè oportet, ut continuus sit horum usus, & lintea continuo madida sint his succis. secundum genus est puluerum, qui sint tenuissimi: & præter hoc aliquo succo aquoso tenui diluantur, & quia isti siccantur, necesse est ut aliquid succi infundatur; & si nihil adestet, aquæ. Tertium genus est medicamentorum compositorum, quæ habent ceram, resinam, aut oleum admixta, & corpus humidum, quo seruatur medicamentum, & penetrat. Principem locum habet uinum austerum, quia in eo est uis siccans terrestritate: est uis adstringens gustu; adest tenuitas substantiæ, ut facillimè penetret ut Gal. testatur: & per uinum austerum accipimus uinum garbum appellatum: & est etiam bonum uinum acerbum, quod adstringens dicitur: quoniam, licet aliquantisper adstringat, non officit tamen. multa loca non habent uinum austerum, ut in Bononiensi, Mutinensi, & Regiensi agris. Madefacite ergo his linteam sensim, & sensim, ne siccetur: est succus hypericonis. Eritis rursum non habentes uinum: sumite hypericon uocatum herbam perforatam, uel succum folii cupressi: caudæ equinæ succus, mille folij succus; duum generum hæc planta est, altera rubro, altera albo flore decorata, & stratiotes etiam dicitur. Pentafilon sumite, & contundite radices, & folia. Ruri nascuntur quædam uesticæ ad latera foliorum in ulmis quæ mense Maio liquore solent esse

4. de fac. sim.
cap. 8.

Liquor ues-
ficarum ul-
mi.

esse plenę, qui liquor, & colore, & substantia melleus esse uidetur: ego nihil reperi oportunius hoc liquore in agglutinatione, & uidi mirabilia in uillicis de hoc liquore. Sed uidi maiora: quidam ex Erroribus perforabat manumillam, femora, brachia &c. pugione, & solū huiusmodi liquore mixto melle spatio 24. horarum sanabat. Potest feruari: colligimus enim & utimur in podagricis affectibus, quum sunt podagricę fluxiones. Mense Maio colligimus, quoniam tardius nascuntur uermiculi conferentes. Explemus sialam uitream, & cera, & linteo obturamus postea facimus foueam in terra per altitudinem pedis, & in fundo foueę ponimus salem communem, supra quę ampullam collocamus, & deinde explemus foueam terra, ita ut operiatur ampulla terra, & relinquimus per spatium 20. uel 25. dierum, & postea diuidimus feces à substantia clara. Tormētūllę omnes expresso succo, bonę sunt: sed consolida maior, & consolida media faciūt præter modum: ultimò illa herba, quę uocatur pimpinella extracto succo oportuna est. Pulueres adstringentes sunt ueluti manna thuris, quę partim ex cortice, partim ex thure cōstat: bolus orientalis, corallium utrūque album, & rubrum, gallę immaturę omnia ex malis punicis sunt, ut cortices, flores, & folia: lapis ematithes, terra sigillata, & supra omnia alia sanguis draconis appellatus, resinę omnes. Sed aduertatis ut semper liquore diluatis uel aqua, uel uino, si in profundum debet descendere substantia hæc. Albuc. proponit puluerem in uulneribus capitis & accipit thus, sang. drac. & calcem uiuam: credo, quòd curarit gigantes. Quoniam duo extrema uim causticam habent: est etiam medicamētum ex rosa mirtilis, mirab. citrinis, & diætis à me pulueribus,

lib. 2. c. 28.

De compositis medicamentis agglutinantibus. Cap. LI.



I autem loquamur de compositis medicamentis habentibus mollia corpora, legite Cels. ubi infinita oportuna habetis: ubi est barbarum durissimum ab eo uocatum: habetis coacon oportunum pro pueris: habetis basilicō descriptū pro mollioribus, smaragdinum, ruffum, paracolicum empl. Aetius pariter ponit emplastra. Ego habeo unā bragam meā assumptam ex Gal. qua utor in omnibus, & altero, & uario secundum habitus: si in mediocribus, utor quale est. Et est ceratum barbarum: nam cum uiderim pretiosum hoc medicamentum, utor ego, si non prima, secunda,

lib. 5. tract.
de empl.

lib. 15. c. 22.

eunda, & semper felici cum successu: nam hoc habet substantiam penetrantem, habet enim resinos, ceram, & oleum, habet pulveres tenuissimos; habet facultatem siccandi, & adstringendi, & mitigat dolorem, quod satis est. Et quoniam plures huius compositiones profuerunt ego semper curavi ut formaretur ea ratione, quam docet Gal. quando dicit, Barbarum Galeni, barbarum, quo utor. Estq; duplex, quod plura continet, & quod pauca. Ego priori utor, quod plura continet. Compositio talis est, Accipit picis siccae lib. 8. ego pono pondera Gal. & nisi esset quod oportet supponere quædam, id non dicerem. Cerae citrinae lib. 6. on. viij. resinæ pini lib. 5. & on. iij. aspalati, uel bituminis iudaici, idem enim est, lib. 4. & notate, ut ueltri accipiant bonum bitumen, & si non habent, aduertatis, ne accipiant picem nigram, quam nautæ utuntur; nam est metallicum, & est acre nimis, & facit exustionem; & inflammationem: supponant ergo mumiam, non carnem siccata, sed bitumen, quo plenus est uenter corporum mumie olei lib. 1. s. litharg. cerussæ ærugin. æris ana unc. iij. thuris lib. s. alumin. liquidi unc. j. s. nos non habemus alumen liquidum, curavi, ut conficerentur alumine rocche. alum. scissilis unc. iij. qui erunt in Nobilissima urbe Neapoli poterunt facere hoc; quia Puteolis copiosum est hoc alumen: sed ego addo alumen rocche combustum, quia non habeo scissilem. opopon; squame cris, galb. ana unc. i. s. aloes, opij, myrrhe ana unc. s. terebent. & pro hac possumus ueram capere ex Cypro delatam, & possumus accipere resinam larinicam, uel resinam abietinam, quæ uulgò appellatur oleum abietinum, & quo ponere lib. 2. succi mandrag. drach. vj. cum hoc non habeamus, curo, ut loco ipsius corticem siccatum ponam, aceti lib. v. Galenus docet, ut tritis terendis misceantur, & concoquantur. Sed bitumen iudaicum solet concrecere in lapillos, ideo rarò succedit hæc compositio, semper adsunt grana, & est inæquale emplastrum: ego doctus experientia hoc modo formo. Accipiant litharg. ceruss. & oleum, & coquant, simul donec acquisierint mellis spissitudinem: non perueniat ad spissitudinem, ut non inquinat, satis est, quod dixi. Postea accipiant picem illam nigram, & in alio uase liquifaciant supra cineres, non supra carbonem flagrantes, tunc habeant bitumen tritum, & in cribro perforato sensim inspergatur supra picem semper mouendo, & miscendo: tunc resinam ponant, & alia, quæ diximus, & coquantur donec acetum absumatur, uel medicamentum non inquinat amplius: ego utor in omnibus hoc medicamento; sed, si erit in habitu molli, & parte mollis habitus cera:io rosaceo, cerato mirtino, & facito ex oleo amig. dulc. mi-

s. de comp.
med. per ge.
nera in fine.

scio: sed in duris addo portionem emplastri isidis; nam hoc opportunum est in agglutinandis durioribus corporibus, ut articulis excarnibus, & cute capitis: cum barbaro uero tempore frigido diluo ceram mastichinum, uel camomillinum: tempore calido rosaceum. Emplastrum autem isidis repertum fuit in Aegypto in templo Vulcani tanquam diuinum. Et hoc habebant in consuetudine Antiqui, quod, si quis medicamentum inueniebat bonum, ponebat descriptionem in templo, ut statim legens haberet: nostro tempore secretè seruanti: tunc loco tabularum uotiuarum in templo Aesculapii ponebatur tabula describens historiam affectus: iam ponitur mulier decumbens in thalamo. Et ideo Hipp. inscribebat opera sua practica ex huiusmodi uotis appositis templo Aesculapij: appellatur autem empl. Ephigoni, quia Ephigonus ob delictum carceratus liberauit principem hoc emplastro & sic liberatus fuit: uocatur Hermonis sacri scribæ, uel Hermonis sacerdotis hac ratione; quia Hermon apposuit, uel liberatus est hoc medicamento, quod fit: Accipimus ceræ luteæ drach. c. colophoniz drach. cc. radicis dracunculi, ar. siccati, squamæ aris rubri; æruginis, aris, aristol. rotundæ, thuris, salis ammoniaci, Thimiamatis, aris uisti an. drach. viij. alum. rotundi, & loco eius ponetur alumen rochæ drach. vj. aloes, myrrhæ, galban. ana drach. xij. olei antiqui lib. i. aceti q. s. hoc non coquitur, sed crudum miscetur hoc modo: primum accipimus omnia metallica, & ponimus in mortario, & dissoluimus cum sufficiente aceto, & oportet esse sub sole diebus canicularibus, ut incalascet medicamentum; deinde affundimus eliquabilia eliquata, & sic infundimus; tertio inspergimus pulueres, & sic pistillo miscemus, hoc pacto formamus magdaleones, quos in aceto seruamus in uase æneo tecto aceto, & seruatur ad duos, tres, quatuor, & quinque annos. Et ego non possum reddere rationem (ecce quod experientia infinita docet) quare aceto seruatur: si extra acetum fuerit amittit colorem: ex uiridi fit luteum: & siccescit in sex mensibus; si seruatur in aceto semper seruatur æqualiter uiride: & si habet uim erodendi; aceto mitigatur, & in uase æneo, ut acetum inde uim acquirat adstringendi, & unguento communicet. Norate tamen quod in officinis habemus unguentum, & emplastrum isidis. Unguentum nihil aliud est, nisi una pars emplastri isidis, & duæ partes cerati rosacei; & si molliorem uolumus miscemus tres partes cerati ros. cum una empla. isid. Noster Hipp. proponit compositionem medicamenti ex succo uuæ acerbæ, quod opportunum est pro siccissimis, & robustissimis corporibus agglutinandis.

De modo applicandi medicamenta. Cap. LII.



Imponimus autem medicamenta, aut quotidie mutando, aut alternis diebus: nisi effluat ichor copiosus in vulneribus non detegendum est vulnus quotidie, multo minus bis in die, ut multi faciunt, non consistit in hoc uirtus Medici, sed in compositione optimorum medicamentorum, nunquam ergo detegite vulnus, nisi alternis diebus: & si constringenda labia, uel multus humor effluat, tunc quotidie. Primò ergo debemus exprimere uulnus, & linteolis humidum & purgatum facere ut d. Hipp. & Gal. quando uolebat siccare uulnus neruosum solebat lanam accipere, & madefacere uino dulci: nos possumus facere hoc idem, & ego utor coctone, & aliquantisper sputo lenio, & specillo alligo, & purgo uulnus. Hoc agemus usque ad quartum diem, & si uidemus agglutinatum uulnus, auferre debemus fibulas forcipe, uel gladiolo, uel alio instrumento: & statim, quum se&æ fuerint poterimus auferre; sed facilius est relinquere ad alteram diem, quia facilius mouebimus. sed cur non linquimus? quoniam non solum fit cicatrix uulneris sed cicatrices transuersæ, ueluti rastrum: quia futuræ faciunt cicatricem propriam: quum igitur hoc fiat, hæc est causa quòd ego aliquando tertia die, & secunda etiam soleo remouere suturas. Ista erunt agenda, & ita erunt hæc agenda, ut primum scopum habeamus, sed nota, quòd aliquando non sufficit hoc, superueniunt enim causæ impediētes, aliquando superuenit dolor ingens, ut impediat rationem hanc medendi: superuenit tumor rumpens infibulationem: aliquando fluit copia humoris ingens: idè non solum oculum ad locum affectum habere debemus, sed etiam ad omnes partes: at hoc impediamus, & opus est ut quisque habeat oculos intentos ad sex genera rerum, quæ non naturales dicuntur, & solent corpus alterare: castigate has, unde opus est, ut uacuetur corpus, si plenum est aduertendum circa cibum & potum, motum & quietem, somnum, & uigiliam &c. circa uacuationem & plenitudinem oportet ut se exerceat Medicus.

6. Meth. 3.

An mittendus sanguis. Cap. LIII.

In primò oportet uidere an mittendus sit sanguis nec ne: in qua re differunt Medici: aliqui nolunt, ut secetur uena: & omnes aqua, linteis & elixis, oleo uel stillatio sanant: uenam negant esse secandam: & dicunt eius secandæ non adesse indicationem: est uulnus simplex sine symptomate, uulnus ut uulnus

H 2 solu-

solutio continui non indicat sectionem uenę. Præterea hoc etiam
 confirmant autoritate Gal. 4. meth. 6. ubi loquens de sectione ue-
 nę d. In omnibus his non immemor sis non esse ulceris, qua ulcus
 est ullam id genus curationem, loquitur de sectione uenę, à soluta
 igitur unitate non indicatur sectio uenę. Præterea est autoritas
 Hippo. in lib. de ulceribus, uult ut sanguinem à loco affecto educa-
 mus, nullam mentionem facit de sectione uenę, ergo inutilis est se-
 ctio uenę. alii uolunt, ut secemus, & dicunt cum Gal. secandam ue-
 nam non in omni paruo, & nullius momenti, sed quum est uulnus ma-
 gnum, quamuis simplex sit, quoniam omne magnum uulnus ex 4.
 meth. 6. indicat sectionem uenę, quia morbus magnus. Magnum di-
 cimus, uel quia magni spatium occupat essentia sua, uel magnum
 ratione partis nobilis uulneratę, uel est magnum, quia habet occul-
 tam naturam malam, & qualitatem ueluti symptoma non ita manife-
 stum, ergo non ut simplex indicat sectionem uenę, sed ut magnum,
 quare in omni uulnere magno etiam simplicissimo debemus secare
 uenā. Ego nec cū prioribus, nec cum his sentio: nō cū prioribus, quia
 licet uulnus ut uulnus non indicet sectionem uenę, tamē cum actio
 agglutinationis à natura fiat, natura debet fieri integra ualens, & si
 non est, fiat, & hæc sit siccitate seruata uel ratione partiū, uel ratione
 totius habitus: pars sequitur habitum. Si habitus humidus non potest
 siccari nisi sectione uenę: si sunt humores peccantes in quali debet
 medicamento uti, si boni, sectione uenę. Sed quod magnum indicet
 sectionem hanc non est uerum: ego ergo laudo, ut in uulnere simpli-
 ci alicuius momenti secanda sit uena, non ratione magnitudinis, sed
 quia uulnus indicat siccitatē, quę siccitate uniuersi habitus acquirēt,
 sed hoc nō sit tutius quā sectione uenę: possumus id sectione uenę, su-
 dore, balneisq; præstare, sed cōmodior est sectio uenę ne alteret cor-
 pus. Hipp. nō secuit, Celsus uerus interpres Hipp. q. non eloquiū facit
 lōgum, sed Hippocraticū seruat stilum, dicit, Medicus debet mittere
 sanguinem ad siccitatem mouendā: fluat ergo sanguis multus ad sic-
 cationem (subdit) & abundantiorem; sed si non fluxit, quantum satis
 est, secetur uena. Non consentio cum aliis, qui uolunt, ut secetur ue-
 na ratione magnitudinis morbi, quoniam hoc falsum est; magnitu-
 do morbi, magnum remedium quærit, celeritas, celer; sed Gal. in
 illis locis coniungit magnitudinem, & uehementiam morbi: quę ue-
 hemens remedium incidat, inter quę uehementia remedia connume-
 ratur sectio uenę, & inter hæc est ultio, sectio particularum, &c. ue-
 hementia ergo morbi quærit uehemens remedium, ut sectionem ue-

enę,

nz, & in hac indicatione sectionis uenæ Gal. non satisfacit. non ualet febris magna, ergo secunda uena, nego consequentiam. dico igitur quòd si vulnus magnum est uel ratione substantiæ, uel partis subiectæ debemus seruire siccā tēperiem, & hoc fiet siccatione corporis uniuersi, & hæc siccatio cita, & celer facienda est, & nulla est ita cita in euacuatione boni humoris sicut sectio uenæ, & hoc debemus facere cum cautione magna.

Occasiones quæ indicant secandam uenam. Cap. LIIII.



Dixi in vulneribus magnis mittendum esse sanguinem, in leuibus autem simplicibus quidem non esse mittendum, cum non indicetur aliquod uehemens præsidium, in magnis debemus non ratione vulneris, sed ut præseruemus partē: nā siccato corpore, siccatur pars; præterea impedimus fluxionē; & inflammationē: & si quis petat quæ sunt occasiones, quæ indicabunt uenam secandam: dico primum esse uulnus, secundum uniuersum corpus, tertium passionem animæ, quartum ambiens aer, tempus. à uulnere nobis præstabitur cōsiliū: si obseruemus an copia sanguinis sit egressa, uel non. si egressa est non amplius mittendus sanguis, si pauca, & nulla, habitum non siccatum indicat, & sic possunt fieri fluxiones, & inflammationes: præterea si non est dolor, nulla fiet attractio, & ideo nō euacuemus, nec sicceemus uniuersum. Tertium si futura secta non est uolenta consui corium, & futuræ non sunt multæ, ideo nō timemus fluxum nec dolorem, & propter hoc non mittendus sanguis. Si etiam sit in parte ad quam nō faciliē sua natura fluunt humores, ut in parte superiori, facie scilicet & capite, non mittetur sanguis. Præterea si est vulnus in partibus, carnosiss, & robustis, non est timenda fluxio: sed partes imbecillæ facilius occupantur à fluxione, & ideo tunc mittendus sanguis. Ab uniuerso, nos contemplabimur, an uniuerso adsit plenitudo. nam, si plenum est, secemus. Exēpli gratia, hyeme, si fuerit illatum vulnus, tempore carnis priuii, & quadragesimæ, tunc turgent uenæ, idcō secunda uena. Si non est plenitudo, ut autumno, uel alio thymis tempore, non mittemus. Præterea seruanda est temperatura: in melancholica non est timenda fluxio, in biliosis timemus, ideo siccandum corpus: præterea oportet uidere an adsit febris, nec ne. si adsit, secemus; quia febris eliquat humores, qui calefacti faciliē mouentur, & fluunt ad uulnus: in omnibus

bus tamen seruandum est, dummodò uires tolerant. tertio obseruā de passionibus, nam si homo uilis animi accepit vulnus, si est quietus animus, & non concitati spiritus, non siccandum uniuersum. si autē animus furore per citum uidemus, si non dormit, si cogitat. etiam si coclear sanguinis in uniuerso, fluit ad uulnus, ideo mittendus. Vltimò seruanda temperies aeris: frigidiori tempestate sunt compacti humores, & quieti, & non fluunt, æstate facillimè fluunt, cū sint eliquati. si ergo uidemus causas indicantes periculum fluxionis, secunda est vena: si uerò non, non debemus hominem cruciari; secabimus igitur dextram vulnerata parte sinistra seruata rectitudine. si femur dextrum vulneratur secamus basilicam brachii sinistri: poterimus etiam vulnerato uno crure secare uenā in alio, sed nō est in usu.

De medicamento purgante. Cap. LV.



Etiam possumus euacuare pharmaco, quod despiciunt qui aquis sanant, sed decipiuntur: non indicatur euacuatio à vulnere, sed à fluxione, ut præferemus ergo à fluxione, uel ut expellamus, pharmaco euacuamus, & quā iter humores potius fluit biliosus: tanquam regulam cōem profero, quod illa potissimum requiritur, quæ biliosos expurget humores: & reuera morbi ex vulneribus superuenientes duo sunt, aut inflammatio, aut erisipelas, quæ sit à bile. & ideo, si quis humor fluit, biliosus est, euacuabimus autem præcipuè in his, qui tenui digita usi sunt, & medicamento cholagogo, idest bilem ducēte. Hipp. utebatur ueratro ipso, quoniam uti habemus ex Gal. in com. de fracturis, homines tempore Hipp. erant uiuaces, mundi, & ideo non abundabant excrementis, & ut summatim dicam pauperes erant, parū comedebant, erat miserum genus hominum. Semper eandem noui hominum speciem. Dimittamus Noem, & Moysen, aliter medicina tradita ab Hipp. & Gal. non esset cōueniens nostris temporibus. Vtus ergo ueratri non est apud nos; quoniam non utimur euacuatione per superiora: sed nos non utimur tum ob mutationem uisus, & propter mollia corpora; tum quia nescimus ueratri præparationem, & Galenus etiam confitebatur se ignorare. semper ergo per inferiora euacuamus exhibitō medicamento bilem expellente. Inter quæ peculiarem locum habent cassia, thamarindi, syr. ros. sol. syr. uiol. sol. manna, ascendatis ad elect. de succorof. uel ad diaprun. sol. uel ad elict. de psillio & quamuis adsit scammonium

nium urens, tamen ita mixtum est, ut nocumentum non sit timēdū.

Quæ sunt vulnera, in quibus purgatio necessaria. Cap. LV I.



Ed quæ sunt ista vulnera? quæ alicuius momenti sunt, in quibus inflammationem timemus? primū sunt vulnera capitis, secundū sunt vulnera utriusque uentris, & thoracis, & abdominis, tertio sunt vulnera articulorum. Præterea, si superuenerit, aut inflammatio, aut erisipelas: sed notat Hipp. si addita sit futura. In quibus uerbis duo genera causarum proponit: prima causa, qua debemus pharmacum adhibere; quia si adest futura, inditum est magnum esse vulnus, & magnum vulnus incitat naturam, quæ concitata bilem expellit. Præterea futura facit dolorem dum situr: præterea fibulæ proritant partem, & excitant dolorem. Addatis de meo capite, quod omnia vulnera, in quibus uel necessaria sectio, uel necessaria dilatio, uel necessaria abrasio alicuius ossi, semper indicant pharmacum bilem soluens; quoniam semper ingens dolor sequitur ex his tribus, & in abrasione oportet seruare detectum vulnus, & proritantur partes à frigiditate.

De præparatione humorum. Cap. LV II.



Ed si uidetis non tantū bilem, sed humorem melancholicum spurium, uel pituitam, cum sint crassi humores, & non facile fluant, in hoc casu erit parandum corpus una, uel altera die antequam detur pharmacum, tanto magis cum non facile fluant humores hi.

De ratione uictus & primò de cibo & potu. Cap. LV III.



Portet etiam rectè, & moderatè uiuere egrium. Sunt sectæ, Medicorum quæ non curant rationem uictus, & omnes, qui sanant aqua benedicta, uel balsamo stillatio exhibent carnes, & uinum maluaricum: & Theodoricus, & Henricus chirurgi exhibent carnes & uinum, & uidetur, quod sit cum ratione factum: nam, si oportet explere vulnus sanguine, necesse est uti optimo alimento

mento, sed satis est humiditas indita carni ad glutinandum vulnus, non est necessaria tanta plenitudo; quare in vulnere alicuius momenti, quod requisierit futuram, semper tenuem exhibere debemus uictus rationem, hoc est, quod paucum alimentum subministret, quod frigidum sit, impediens fluxum, non calefaciens humores. Sed si vulnera sint magna uel omne cruentum vulnus ante septimam requirit tenuem uictum, etiam si sint quae minantur inflammationem, uel erisipelas ut sunt illa, in quibus sanguis abundat. Tertio omnia vulnera capitis, thoracis, abdominis, articulorum, & ut uno uerbo Hipp. utar, confuta talem uictus indicant rationem, fugite uinum, ut Diabolus crecem. exhibete aquam uario modo paratam: saccharo incoctam uel cinnamomo, aut purissimam: non exhibeatis carnes, nec oua ante septimanam: ius dare potestis. Si non est vulnus tanti momenti concedite ouum, sed integrum, quoniam contemperatur luteum, albo illo frigido: sed si potest fieri, dimittite oua. Exhibete panem lotum, lactucas, endiuia coctam, spinachiam coctam elixatam, orizam cum semini bus illis communibus frigidis uocatis ex cucumere, cucurbita, melone: fugite fructus, non quod non sint opportuni; quia frigidi sunt: sed quia faciunt sanguinem, qui facile feruet, sicuti mustus quum sit uinum: & ideo si exhibentur frigidi sint, & cocti, ut pira, uel poma, & ex his pauca, uel nulla exhibeatur pars. Solent siccire; exhibite syrupum de endiuia, acetosum simplex, syrupum de rosas siccis, syrupum uiolaceum: aliquando oxizaccarum diluite; quoniam lotium prouocatur, & extinguitur sitis.

De motu & quiete. Cap. LIX.



Praeterea oportet, ut vulnerati sint in quiete, aut stent aut ambulent, aut sedeant, semper malum est in uulneribus partium inferiorum; oportet ergo ut semper aegri decumbant in lecto, sed ita decumbant, ut optime, placide, sine incommodo maneat pars uulnerata. Exempli gratia; si sit vulnus in manu debet suspendi; sic etiam in pede, ne facile fluant humores: aut ad minus semper aequalis sit: ad hoc aliud notandum, quoties fuit uel ligatis uulnera uidete an membrum impeditum remaneat à motu: & ideo oportet scire, quod aliqua membra commodiora sunt flexa, aliqua extensa, ideo oportet extendere eas partes quibus extensio prodest & sic etiam eas quibus flexio commoda erit. Exempli gratia genu uulnera-

neratur, quod moueri non poterit, oportet ne ligare crus rectum & integrum uel ut flectatur? commodius rectum remanet, ergo rectè ligetis. Viceuerfa ligatur pars cubiti, oportet flectere: quia collocatio comoda magis est ut seruetur flexus. Hinc naîu est prouerbiû, Cubitum ad collum, crus ad lectum, esse ponendum, ita in manu si vulnerentur articuli digitorum, aliquantisper flectant, nam hic usus præter naturam erit commodior homini, quàm quû remanent recti.

De somno & uigilia.

Cap. LX.



Equitur, ut substituatur ratio somni, & uigiliæ; quoniam somnus humectat, uigilia exiccat: solet facere ad fluxionem sanguinis somnus nimius: ideo ne profundo somno corripiatur æger, si timetur fluxio; & prætereà, si uulnus fuerit in articulis, & extremis partibus, quoniam somno refrigerantur partes illæ. Et ego uidi aliquando in fluxionibus, in quibus frigore usus fui, id est medicamentis frigidis, quòd excitabatur fluxio ex somno profundo; & ideo non retinui fluxum, nisi pannis calidis, & excitatione somni: unde in hyeme in omnibus uulneribus extremorum calefaciendum est; & ideo somnus longus non est tribuendus; sed dum non timeamus fluxionem, demus somnum. Prætereà in partibus, in quibus dolor est, utilis est somnus; quia somnus dū retrahit spiritû, sopita facultate mitigat dolorem. Prætereà impedit fluxionē retrahendo ad interiora.

De ambiente.

Cap. LXI.



Ambientis etiam aeris habenda ratio tradita ab Hipp. in lib. de Vlc. ubi dicit, tēpus calidius commodius uulneribus exceptis his, quæ sunt in capite, & in uentre superiori, & inferiori: ergo semper commodius tempus æstiuum, quàm hyemale. Prætereà adhuc commodius est tempus æquinoctij: cū tres qualitates proposuerit Hipp. frigidissimā, quā intendit, quum dicit hyemem: calidissimam, quum dixit, Calidius, temperatam, quādo dixit æquinoctium: quoniam tunc commodissimum est tēpus: secundū tēpus commodius est æstiuum plurimis uulneribus. Tertium est incommodius excepto capite, & uentre: cui addendum, quòd ratione aeris cognoscimus tempus; nam habemus aerem ambientem frigidum, calidum,

& temperatum. Ambiens iste aer uariatur à natura, lumine scilicet solis: ita dicemus de ambiente factò arte; possumus stufa reddere aerē calidum: possumus apertis fenestris, delatis niuib; à montibus, & aquis infrigidare. Præterea non solū aer est obseruandus, sed auulsiones, deterforia, medicamēta, manus Medici, & linteola, in quibus hoc idem requiritur, ut harum actū calidissima, frigidiora, & mediocria inueniantur: ambiens ergo à natura temperatus prodest: arte qui temperatus erit præstantissimus est. De contingentibus. Medicus non habet frigidās manūs, neq; medicamentū sit frigidum, &c. æstate sine temperatē frigida; hyeme calefacienda temperatē. testis est Hipp. qui æquinoctium maximē probat: ideo reprehendendi, qui aqua frigidissima curant in media hyeme: sed, si temperata nō habemus, calidum minus offendit, & commodius est. Sed in quibus uulneribus huiusmodi actū calida non explicauit Hipp. sed credo, quòd intellexit de uulneribus articularum, quæ partes frigidæ sunt, & ideo tempore æstatis, si extremum uulneratum est, non tentetis temperare frigido: & tempore hyemis temperate calido: & ideo aliquādo stuppa, aliquando pellibus obuoluatis partes uulneratas. excipit Hipp. caput, & uentres, in quibus frigidum quærit: qua ratione? uidetur mihi duplici causa: primò; quia dicebat in aphorismis, uentres hyeme calidiores, quoniam per constipationem, quæ fit ab ambientibus frigidis continetur calor naturalis; & ideo expellunt facillimē excrementa, & faciunt oportuniorē concoctionē: calor ergo dissipabit; & ideo mu-
 mia oportuna non exercebit. Præterea uētres, & caput sunt uasa magna continentia sanguinem; & ideo ambiens aer non est timendum, ut suffocet calidum; sed semper tanquam ualidissimi, & robustissimi resistent; at in extremis uasa parua sunt, & à frigore superatur facultas. Cū robur uentriū p̄ antiperistalsim ualidius reddatur, ideo frigus non nocet: sed calor eliquat humorem, & feruorem inducit, & dissipat; iccirco oportunitatem est tempus temperatum: sed, si eligendum est unum extremorum, frigidum eligendum est. Hinc uidetis, quā allucinentur, qui ex sententia Gal. dicentis cerebrum calidius aere tempore æstiuo: uolunt, ut æstiuo tempore calefaciāt omnia; & ideo semper igniunt, & coquunt cerebrum & omnia: ac in ciuitatibus, in quibus aer est tenuior hoc præcipuē faciunt: ideo hi occidunt ægros, & dicendi Medici hominum coctores. Ego dico, quòd minus patiuntur uulnera capitis à frigidis: habete ergo curam, ut hyeme temperetur frigiditas, æstate tempus quale est, oportunissimum erit.

*De animi passionibus.**Cap. LXII.*

Passionēs animi sequuntur: ideo adstātes aduertant ne referant uulneratis, quæ mala, & incommoda uidentur: uidi mira. Ego habebā os fractum cuiusdam Veneti, qui habebat patrem morbo laborantem: usque ad duodecimam peruenit; pater obiit: mulieres ciuitati significant parētis mortem: illamet die adeō turbatus est, ut os ligatum in propria sede dislocatum fuerit: & ideo impressiones nocent. ite iucundi uisus: estote mendaces; & hilari fronte, ideo in uulneribus puerorum tenellorum opus est concedere noxia eis: si conscruem eos sine fletu omnia prospera uidi; sin minus, contrā. Veneris etiam habeatur cura. Nam, quāuis Iacobus referat exemplā quorundam Bononiæ uulneratorum in capite, qui continuē noctu coibant: uellem, ut retulisset exempla eorum, qui mortui sunt, ob hoc coitus impedit, & tentigo etiam, consolidationem: statim effluit tentigine sanguis.

*De his, qui potionibus tentant agglutinationem.**Cap. LXIII.*

VNum nōtat Guido, quodd sunt aliqui chirurgi, ueluti Rogerius, &c. qui glutinationem tentant per potiones intus sumptas ex medicamentis calidis confectas: nam cū agglutinatio debeat fieri à natura: assumpta in corpora non solum uiscera conseruant; sed articulos etiam affectos; & ideo potiones calidas ex uino exhibebant. sed uituperatur hoc à Guidone: quare nolite exhibere has potiones; quia licet siccare possint habitum uniuersum, & partes etiam; tamen periculosa sunt; quia antequam siccant, calefaciunt: calefacto habitu fit fluxio, & sic inflammationes succedunt: sed, si exhiberetis, quæ habent uim siccandi, & non calefaciendi, v.g. ex consolida maiori, & media, pentafilo, tormentillis omnibus, pimpinella, ormino uero, & syluestri: laudo: sic etiam decocta ex talibus; sed calidas potiones semper mittatis, & presertim uinum, ut dictum est.

Quando agglutinare non possumus, tentamus secundū scopum C. LXIIII.



In superioribus proposui duplicem rationem sanandi uulneris, alteram in conglutinandi labia, alteram, ut cauitas expleatur carne, & hæc erat secunda intentio, uel uia secundæ intentionis, uel secundus scopus, & sifarcosis à Gal. idest concarnatio dicitur, & tefis, idest colligatio: quando primum scopum non assequimur accedimus ad secundum: uulnera, quæ dicuntur caua non possunt sanari per primum scopum, distinguimus omne uulnus in cauum, & non cauum: nec per cauum profundum intelligimus; quoniam omne uulnus profunditatem habet: sublimia uocamus, quæ paucam cauitatem habent, quæ cutim fractam habet: sed uocamus caua uulnera, in quibus deest caro, idest substantia ipsa. Et hinc est, quòd omnia ulcera semper caua sunt: quoniam non gignitur in corpore nostro ulcus, quod substantiam non absumat: ita si casu circulariter esset celsum factum uulnus & substantia esset comminuta, non potest agglutinatione coniungi; oportet carne explere. Sed, si quis quæret, non ne succedet agglutinatione etiam, quòd deest caro: concedo, sed nimis difficulter fit. Si deest substantia, & uoluntus coniungere erit uolentia magna, dolores, & inflammationes faciens: & ideo fugimus eam, sed fit in partibus laxis, ut in facie, & subauribus. Secūda occasio, in qua nos tentamus secundum scopum, est in illis uulneribus, in quibus deligatione & sutura uti non possumus, & ita non possunt uniri partes, & in illis ex petenda est expletio carnis. hæc autem, sunt, quæ nimis magna sunt: sunt illa, quæ nimis magna sunt in articulis: sunt illa, in quibus expectamus, quòd os abscedat, uel ligamentum uel cartilago recedat. Quartò sunt illa, in quibus fluxum sanguinis magnum timemus: sinimus enim tunc apertum uulnus, & tentamus secundum scopum. Preterea omnia uulnera, in quibus timemus magnam collectionem saniei hanc curationis normam exposculant. Hæc cognoscemus. Primo erunt illa, in quibus non possumus aptare deligationes impediens fluxionem, & erunt, quæ in axillis sunt, quæ circa articulos: & erunt quæ in corpore accident cachochymo, præcipuè si laboret corpus scirrho hepatis, & lienis: in his enim semper fluit maxima saniei copia, idco non tentate primum scopum; sed sipe aperta uulnera, si non fuerint in facie, & in partibus, in quibus turpitudinem cicatricis timemus. Si igitur proponitur laborans uulnere simplici hoc pacto dicto statim non esse suendum statuo.



Rimum quod proponitur est, ut sistam sanguinem, prius tamen quantitas multa egrediatur: sed, quum excedit terminum, cohibete: & imprimis digito tetis profunditatem: si uulnus inæquale, aperiat, & firmetis sanguinem: & duplicē habetis modum cohibendi sanguinem. Vnum à Paulo propositum:

6. lib. c. 30.

alter modus est communis: primo modo Antiqui accipiebant linamenta quæ madefaciebant posca aceti frigida, & imponebant uulneri, quando non erat uehemens sanguinis copia, linteolis siccis, & linamentis siccis utebantur: nam linamenta ista, quum fuerint imbuta sanguine, fit grumus claudens orificia: postea uino madefaciebāt, & oleo: Hic est modus Antiquorum: sed recentior modus magis placet cum albo, & luteo oui; quoniam facultas eius frigida est, & apta etiam. Præterea Gal. 13. meth. cap. de ulceribus oculi, dixit; Quando uolumus aliquid oculo imponere, debemus albo oui uti; quoniam uiscida illa substantia lenis est: linamenta, quamuis mollia sint, non habent tamen proportionem cum carne humana; quia sunt frigida, & sicca: ideo madefiant albo oui, ut partes tangant absque dolore: sed ego probo, ut luteum etiam imponatur, eò quòd uim mitigatoriam etiam habet: præterea, quum auferimus medicamenta ista, reperimus aliquando uulnera cruda, si luteum ponimus concoquit uulnus, & ideo commiscere debemus albo. Modus imponēdi notus est: sed ne salem imponatis cum albo oui, ut aliqui faciunt: siccatur enim mordicat, & cruciat. Concutimus album, & madefacimus molle linteolum, & imponimus uulneri: postea explemus uulnus linamentis: aliqui hoc non faciunt; sed præstantissimus est hic usus, præsertim, ubi ad sunt pili; quoniam linamentum recedit absque dolore. Hoc modo debemus explere uulnus pro suppressendo sanguine: præterea facimus, ne uulnus grumis expleatur, & putredinem pariat: tertia causa ut magis latum maneat uulnus, & latitudinem æqualem accipiat, & sanie non repleatur.

De linamentis.

Cap. LXVI.

Mentionem feci linamentorum, necesse est, ut declarem terminos. Debetis igitur scire, quòd præter instrumenta chirurgica ferrea, vel argentea, sunt instrumenta, quibus utitur ad continenda medicamenta, inter quæ quædam non tangunt vulnus

vulnus, vt fasciæ, & de his dictum est suprà: quædam tangunt, & de his loquamur: ista dicuntur instrumenta ad seruanda medicamenta supra vulnus: à Græcis dicuntur mota, vel motaria, vel tilmata vel tilmatia, vel splines vel splinia: his vocibus donantur à Paulo, Gal. & Hipp. à Latinis linamenta dicuntur ratione lini, penniculi vel pennicilli, turundæ, plagulæ, & splenia, à barbaris nostris tentæ, hasteolæ, lichnia vel lichnes, quasi licinia; ista sunt corpora texta vel ex stuppa, vel ex filamentis, vel ex lana, vel ex gossipio, & huiusmodi, quibus vtimur ad hunc vsu; & stuppa vel est canabina, vel linea. Sed aduertatis vt sint stuppæ integræ: nam ego obseruaui dum stuppam imposui, vbi mures nidificarunt, quod tâta facta fuit attractio, vt miratus sim, stercore enim soricum nimis attrahentia sunt, & lotium similiter; itaque electa & integra assumatur; præterea in his solent esse festuæ pungentes, remouete has, sunt enim diabolicæ: habemus lanam qua Antiqui utebantur. Tertia materia habetur ex gossipio, bombace, coctone. Habemus linteum lineum attritum, quod excerpere solemus, & diuidere stamen à subtegmene, ac ex his solemus facere linamenta. Vltimò habemus spongiam, qua vtimur solùm in vno casu, quando volumus vt madeat vulnus aliquo liquore; sed in reliquis nullus est vsus: Antiqui linamenta solebant ex hac conficere. Nos vtimur, quum fistulam & ulcus dilatare volumus; at non in vulneribus. Sed qua figura fiunt linamenta? Ex eadem materia omnia fiunt: differunt tantum figura. Aliqua sunt quæ oliuarum figuram tantum habent, & ista propriè linamenta, turundæ & pennicilli vocantur: quaretiōne? quia præter id quod constant ex materia molli, habent pennicilli similitudinem, quo vtuntur pictores, & motaria dicuntur à Græcis. Si fuerint textura lata & oblonga habentia similitudinem cum liene animalium, ab ista similitudine splines vel splinia vocantur apud Græcos: sed ista sunt trium generum, aliquot parua, quæ cum vnguento ponuntur in vulneribus: aliquot magna, quæ solent obuolui artubus loco fasciarum. Tertiò sunt linteola lata, quæ ponuntur extra vulnera, & hoc apud Gal. & Hipp. dicitur linteum latius. Quum medicamur, primò petiam magnam paramus, quam vnguento replemus, & figuram habet oualem: postea paramus hasteolas paruas, quas vngimus medicamento: vltimò paramus pennicillos quosdam paruos, veluti oliuas & nucleos. Primum est splenium Hipp. præterea nos accipimus linteum magnum, & triplicamus, & si vnum non sufficit, duo & tria imponimus, vt æquetur membro, & illa linteola vocantur splenia, quibus cavitates partium explemus. Aliquando addimus

mus figuram longiorem & limuifcos, & licinia appellamus. Præterea linamentum paramus clauī figura; iſtam etiam tentam appellant Recentiores: linamentum in longitudinem implicatum vocat Celfus. Hæc linamenta ſunt ad conſeruanda medicamenta, ad detergendam ſaniem, ad liſtendum ſanguinem, &c.

De medicamentis ſarcoticis ſimplicibus.

Cap. LXVII.



Duertatis, quòd quum manent linamenta per ſpatium vigintiquatuor horarum, contrahuntur & dolorem faciunt: interea habete vinum auſterum, rubrum, æſtate frigidum, hyeme calidum, & infundite. Hoc habito videbitis an coctum ſit, an crudum vulnus: quum rubro colore infecta erit caro; ſi erit os ſubiectum, videbitis an candidum, an ſubrubens: & linamentum pauciſſimo, & albo erit infectum pure, tunc vulnus erit coctum. Si nigra caro, pallescens os, & carnes neruoſæ non candidæ, crudum erit. Si vulnus coctum eſt, opus eſt vt expleamus carne: ad quod duobus opus eſt, quæ Medicus nõ poteſt efficere: primum eſt materia ex qua: ſecundum eſt cauſa efficiens carnem: materia iſta ſanguis eſt, qui qui dem opus eſt vt habeat commodè proportionem cum parte. Si neruoſa pars, frigidior & ſiccior & craſſior ſit ſanguis: ſi carnoſa, calidus & humidus: ſi paucus ſanguis non oportuna quantitas gignitur: tanta ergo ſit, quanta neceſſaria eſt. Præterea qualitas ſanguinis obſeruanda: natura moderatur materiam iſtam, ſi eam Medicus moderatur, id autem efficitur ſi victus nec plenus, nec tenuiſſimus ordine tur: pariter habeatur ratio & euacuationis, & in ſumma omnes res non naturales rectè inſtituantur. Cauſa efficiens etiam obſeruanda eſt, & eſt temperies partium, & hæc ſeruantur conſeruatione uniuſi ſi habitus: & hoc dictum eſt quomodo per ſectam venam, & pharma cum, & ambientem ſit tractandum. Præterea conſeruandus habitus ſiccus partium: & hoc fiet per medicamenta ſiccantia. Verum non ſatis eſt, ut medicamentum ſit ſiccans; ſed illud memorandum Gal.^{3. meth. 1.} ubi dicebat, quòd iſtud idem ſit in generatione iſtius carnis, quod in nutritione corporis; in quo duplex oritur excrementum: alterum tenue, quod exhalare ſolet per poros inſenſibiliter, & aliquando in ſudorem uertitur, & apparet; alterum excrementum craſſum eſt, & dicitur fordes, quod manifeſtè apparet: ita in generatione carnis, qua vulnus explemus duplex eſt excrementum; & hoc alterum erit, quod ichora, ſaniem

niem uocant, & hæc est substantia humida tenuis: & hoc indicat carnem mollem præter modum generari; ideo oportet, ut sicceatur, si uolumus solidam carnem. Alterum excrementum est crassum, tenax, uiscidum: quod cum lene est æquale, & moderata habet omnia, pus dicitur: sed quum nimis tenax, & uiscidum est dicitur sordes. Aliquando crescit hoc excrementum, & ita hæret, ut impediat generationem carnis; unde sordes congenita solet dici; quia est ueluti candida caro, quæ concreuit cum uulneribus, ideo sensim & sensim à uulnere remouenda. Primò ergo medicamenta siccantia adhibenda sunt: secundò siccantia ichorem, tertio habemus medicamenta detergentia: hoc autem fit à Medico, gossipio, linteolo appposito comprimendo, uel lana, ichorem remouendo, & detergendo sordem: à medicamento id etiam præstat, si fuerit siccans, & detergens: explendum ergo uulnus concoctum, & hoc per generationem carnis, in qua natura temperies debet seruari, id est siccitas: ergo medicamentum siccans debet esse, atque detergens. Vnde Gal. medicamentum detergens debet esse facultatis siccantis, & tenuitate penetret, & qualitate siccante dissipet quod glutinet partes: nam omne, quod copulatur, humiditate copulatur: humiditate enim dissoluta dissoluitur compactio, & fit separatio. Hæc facultas dicitur deterforia. Vnde habemus detergentia calida, & frigida. Frigida tenuitate, & siccitate detergunt: calida si militer; sed maior fit deterforia ob caliditatem. Ex quo colligatis medicamentum sarcoticum esse siccans, unum componens, alterum dissipans, & detergens. Sed cum medicamenta siccantia aliqua mordacia sint, aliqua non: hæc uel calida erunt, uel frigida. exempli gratia, detergit cum morsu, & frigidum est acetum, succus uux immaturæ, succus mali punici acidi, succus herbæ trinitatis, & acetosellæ. Idem dico de succo narancij, & citrij mali, quæ frigida sunt, & detergunt cum mordicatione. Ista inopportuna sunt; quia mordicant & dolorem faciunt; quoniam etiam solent colliquare carnes: nam omnis mordicatio fit uel ratione caliditatis, uel qualitatis terrestris, uel ab humiditate penetrante ad profundum, & generante dolorem. Sint igitur sarcotica uera, quæ faciunt sine dolore, & mordicatione. Quomodo erit agendum hoc? Confugite ad præceptum Gal. in 2. & 3. & 4. meth. ubi dicit, quod ablutio aufert mordicationem: si erit materia, quæ non potest abluui, accipite aquam, uel succum, quo uultis uti, & concoquatis ad consumptionem medietatis; quia partes mordicantes absumentur: ablutione ergo, & concoctione aufertur morsus. Sed quum metallica medicamenta accipimus, aceto dissoluimus:

acetum

s. meth. 12.

acetum autem mordax est? Dico quod Galenus non utitur aceto primo & per se ad morsum tollendum; sed facit hoc ut acetum magis attenuet medicamentum sub diebus canicularibus. Sed postea aqua uel uino sunt ablunda medicamenta; aceto attenuatur, & preparatur materia tantum: aqua uel uino auferitur mordacitas. Et obseruate, quod in uulnere explendo requiritur conseruatio habitus, qui est in siccitate: at magna exiccatio non requiritur. Cæterum in illis, qui habitum mollem habent sarcoticis utimur medicamentis, quæ sunt primi gradus siccæ. Quoties puer usque, ad 14. annum uulneratur utemur siccis in primo gradu, in quo est intensum, medium, & remissum; & ideo obseruate proportionem in hoc etiam. Si erit habitus siccus; siccitas medicamenti erit secundi gradus. Et quoniam in istis datur magis, & minus, ideo utemur aliquando Medicamentis siccis in 2. gradu in principio, uel in fine, uel in medio. Triplex ergo est medicamentum siccum ex 3. meth. cap. 3. primum est in primo gradu: secundum in fine primi, & principio secundi: tertium in secundo. Sed oportet uidere quomodo ex medicamento non sarcotico faciemus sarcoticum: si habetis siccum in tertio, uel quarto gradu, & uultis facere in primo, uel secundo: affert exemplum de flore æris Gal. si habetis æruginem, & uultis mederi puellæ, hoc medicamentum de tergit cum maximo dolore: ego minimam quantitatem capio, si non sum in diebus canicularibus, ut: abluas accipio ceram, & oleum, semper enim quum foris sumus, oleum habemus: ut v. g. accipiam olei unc. j. ceræ unc. s. & reperio ferrum rubiginosum, uel derado uas æneum: si erit corpus durum maiorem capiam quantitatem, ut appareat rubigo; si durissimum, adhuc maiorem, ut appareat corpus: minimam in mollibus corporibus, ita ut non appareat. Ordines medicamentorum à Gal. propositorum hi sunt: primum locum obtinet thus, farina hordei, fabarum, & zææ utriusque, uel farri: ista habent uim siccandi in primo gradu: addite lometa istorum omnium uel fabarum, uel zææ, uel hordei, hoc est furfuræ: detergunt enim & siccant sine mordacitate. Secundum locum tenet resina tereb. laric. abiet. & gummi elimi, mel coctum, & despumatum, syr. ros. recens, mel ros. & mel uiol. farinam hordei addamus, farinam cicer. lolij, quæ siccant in secundo incipiente: addatis metallica, spodium lotum, lithar. lotum, sandicem lotam, quam minium appellamus; plumbum ustum lotum & similia, quæ habent uim siccandi in secundo sine mordicatione: sed quæ sunt sarcotica primi sine ablutione in secundo gradu, si abluantur, sicut sarcotica primi gradus. Tertium genus est farina orobi amari,

farina lupini, puluis iridis, omnis aristol. puluis opopan. myrrhæ. sarcococ. mel. crudum &c. Quæ habent uim maiorem exiccandi: sed si abluetis facietis secundi generis. Hæc sunt sarcotica simplicia in primo ordine pro mollibus, in secundo pro medijs, in tertio pro crassioribus. Et quod de toto dictum est, intelligendum est de particulis: neruosa inter crassiores, carnosæ inter mediocres, quæ in genis inter molliores collocandæ sunt.

De sarcoticis compositis.

Cap. LXVIII.



Ed composita medicamenta triplicia sunt: primum est basilicon minus. & dicitur minus respectu compositionis cuiusdam, in qua continentur, in quo propice sicca admiscent pyssasphaltum: sed hoc non faciatis, potius apponito colosoniam. secundum est tetrapharmacum basilicum traditum à Paul. & reliquis Græcis, & præstans est sarcoticum primi ordinis. tertium est resinum uocatum medicamentum, quod ex pura resina, pini, oleo, & cera fit, quod in tenerrimis habet uim siccandi: si autem uos componere uolueritis facite sic, Primū erit sarcoticum primi generis, quod digestium uocatur. & accipiūt resinam uel larinā, uel abietinam, primam terebentinam, secundam oleum abietinum uocant. accipiunt unciam de uno ex his; postea abluunt aqua aut betonica, aut communi, addunt integrum uitellum oui, & constituūt digestium, in primo genere sarcoticorum: aliqui addunt oleum rosatum: quod non probo. quoniam medicamentum illud sordem nutrit, & constipat, non detergit. Aliud est in usu, ut accipiamus unciam eiusdem, & abluamus; postea addamus thuris, uel masticeis, & farinæ hordei ana drach. s. uel loco far. hordei, farinæ fabarum, uel zæ; & illa quæ numerata sunt à me inter simplicia primi gradus, quibus utemur in partibus, & corporibus humidioribus. Composita secundi generis sunt, ungu. basilicum maius, quod recipit myrrham, aloem & quædam quæ detergens efficiunt medicamentum: & non faciatis pyssasphaltum miscere; sed, si non habent picem, colosoniam, uel masticeam imponant. Aliud est medicamentum, quod matrisylua uocatur: cuius descriptio non inuenitur bona. Notate eam, quoniam multos fallit. recipit fol. matrisylu. pulueriz. betonicę pulu. ana unc. viij. olei ros. comp. unc. xx. terebent. resin. pin. ceræ nouæ ana unc. x. gummi elimi unc. iij. uini nigri dulcis, & potentis lib. 12. miscentur: bul-

liang

liant adignem ad consumptionem vini: coletur medicamentum ad aquam frigidam; & quum cōcreuerit, seruato. Hoc est medicamentum in uulneribus capitis præstantissimum. si uultis ut crescat caro, detergit, & siccatur moderatissimè, & fouet partes neruofas, ita ego uitor hoc quando est crescēda caro; in partes neruofas. Aliud est ungu. de gum. elimi Conciliatoris, & Conciliator docet. Addimus ceratum rosaceum, & camomillinum: quod præstantissimum est. Potestis uos etiam componere medicamenta secundi generis hoc modo. Recip. tereb. unc. j. syrupi rosati recentis drach. ij. uel loco eius mellis ros. drach. j. farine orobi scrup. ij. myrrhæ, aloes, thuris ana scrup. j. miscētur hæc. Vos dū recolitis memoria simplicia dicta in secūdo genere, potestis conficere. Tertiū generis nō habemus in officinis nisi ung. ifidis, empl. ex gum. elimi pro robustissimis corporibus. reperitur etiam in officinis abstersiuum medicamentum, quod in mollibus consumit carnem in durioribus generat. Sed uos hoc modo cōponere potestis: Recipe tereb. unc. j. mell. ros. drach. iij. pulu. iridis, opop. aristolo. rotund. ana scrup. j. thuris, aloes ana drach. s. misce pro medicamento. Sed notate unum, ut habeatis normam componendorum istorum medicamentorum: quoniam aliquando mollia, aliquando dura sunt. Quum uultis miscere pulueres cum tereb. satis erit drachma pulueris pro uncia terebent. si autem admiscetis portiunculam mellis, uel alterius liquoris: pro uncia liquoris addite uel scrupulum, uel drachmam pulueris, ut si terebentinæ addidi duas drachmas liquoris addam scrupulum unum pulueris supra drachmam: & sic semper erit benè mixtum cū tereb. medicamentū: sin minus semper in fundo aliquid residet. His factis imbue mus linamenta, uel splenia, & ita explebimus uulnus.

Quid imponendum supra splenia replentia uulnus. Cap. L X I X.



Por tet etiam aduertere, ut seruentur hæc splenia in loco: & hoc duobus modis fit, uel splenio maiori ad dito imbuto medicamēto, uel fascia. Vtrunque hoc ego facio: sed illud medicamentum cuius est generis, quo detinetur splenium? Paul. dicit esse, quod habet tenacitatem moderatam. Sed cuius temperaturæ? ut habeat rationem adiacentiæ. Hæc ratio est, ut habeat uim mitigandi doloris, impediendæ inflammationis erisipel. &, si adsit, repellendæ: ideo non est oportunum imponere sarcoticum medicamentum

mentum illo excepto, quod albo oui, & terebentina fit: unde nos so-
lemus uti medicamento consueto in officinis, quod magistrale dici-
tur: aliud simplex linimentum uocatur: tertium est ungu. de tutia ma-
gistrale. Quartum diapalma, uel mixtum cum linimento simplici, uel
um cerato mirtino, uel rosaceo. Sed si hæc non habemus, sumimus
uinum austerum cum oleo rosac. & ita uincimus postea fascia ma-
lente uino hoc, & oleo. Si copiosa sanies bis in die aperimus, præ-
sertim in ætate, non urgente sanie & calore, semel. ætate uero fri-
gida imponatis, hyeme calida respectiue. Sed in cerebro non affe-
ctatur tanta frigiditas.

De carne supercrescente vulneribus.

Cap. LXX.



Ed solet accidere, ut caro nimis crescat. In eo casu
hoc fit, quia non commodata est materia sangui-
nea: subtrahenda igitur sunt alimenta per frictio-
nes & vincula ad oppositas partes; præterea frigida
sunt imponenda: sed si hoc non sufficit, comminui-
te, vel forcipe vel gladiolo: potest autem id com-
modè præstari, quia non sentit exquiritè caro illa: alia ratio est, ut fri-
et linteolo asperiori carnem illam, & efficiat ut effluat sanguis copio-
sus, sic enim siccatur pars, & retrahitur: possumus etiam facere hoc
medicamento, quum dicta non potest patiens perpeti: hæc moderata
ebent esse non excitantia dolorem: & sunt linimenta sicca: si non suc-
edunt sumimus alumen rothæ combustum; & hoc ita familiare est,
statim Medici recurrant. Habemus emplastrum itidis. Quartò acci-
mus paruum quantitatem nitri exusti, qui comminuit sine dolore
mirabiliter. Est etiam ungu. apost. unguentum viride Damasc. quia
uiue addimus æruginem æris. Præterea squama æris preparata, præ-
cipitatum, erugo æris lota. Sed ego habeo aliud medicamentum: so-
leo accipere unguentum Aegyptiacum, & tempero. Accipite huius
olei ros. cum pl. ceræ luteæ ana miscentur ad ignem, & utimini felici-
ter: & si nimis crescit adhuc, confugite ad Tractatum de Ulceribus,
anno superiori declaratum, capite de Ulceribus supercrescentibus
nimis, ubi diximus multa.



Vm repletum fuerit vulnus carne, tunc cicatrice obducendum est. Sed ante cicatricem noteis vt caro illa quę continetur in vulncribus, non sit absolutę equalis cuti; quoniam cū siccaretur, caua fieret: oportet ergo, vt parū excedat: nam ea ratione fit cicatrix, quę est equalis ex toto. Secundō notandum quōd in omnibus partibus, in quibus os vulneratur subiectum, ex quibus particula ossis discedit, fit caua cicatrix; ideo non est statim deueniendum ad vsum eorum, quę faciunt cicatricem, quoniam opus est vt diu imponatur medicamēta sarcotica, vt caro solida fiat. Et ideo moneatis ægros, ne stimulent Medicum, vt statim cicatrice obducatur; quia caua heret & insanabilis. Hoc ita constituto gignenda cicatrix, quę est callosum quid, quod nascitur in extrema vulneris parte loco cutis; quoniam cutis cū sit pars spermatica generata in vtero non potest regenerari: sed cicatrix à Gal. vocatur cutis, improprie tamen; quoniam similitudinem cum cute habet, fit tamen ex carne: nam sicut caro ex natura sanguine concreto formatur, sic ex spissata carne superficiali formatur cicatrix: ideo causa materialis cicatricis caro est. Causa autem efficiens quę? Respondet Gal. quōd sunt medicamenta imposita à Medico, & illa quę epulotica, cicatrizantia vocantur: vlli enim cicatrix dicitur, & omnes qui scripserunt de his medicamentis consentiunt cum Gal. sed ego habeo in quo dissentiam, quoniam non solū medicamentum est causa cicatricis, sed etiam aliud. Et videte, habeo primū exemplum multorum, in quibus video vulnera magna per se sanata. In brutis quęro à quo fiat cicatrix? Videte canes vulneratos à laniis, & sanatos per se, & cicatricem habentes: habent ne à medicamentis? non. Præterea in puerulis habentibus vlcera magna in capite id manifestum est: quia sanantur & cicatricem habent sine medicamento. Præterea sanantes oleo & aqua, cicatricem inducunt: hæc autem non fit oleo & aqua; natura ergo sanauit, natura cicatricem fecit. Præterea ego video vlcus magnum, quod expletur carne, & postea incipit obduci cicatrice, & tamen non conrescit cicatrix in toto vulnere, sed incipit in margine, non in toto, seu in medio, & sensim & sensim crescit: si medicamentum id præstat, cū medicamentum sit in medio, cur nō crescit in medio? Ergo id non est causa tantū. Præterea video esse carnem exicatam & similem cuti, ideo dico quōd cutis naturalis insita nostro corpori

3. de fac. nat.
16.

3. meth. 3.

corpori est causa efficiens cicatricē: & semper videtis cicatricem incipere circa cutim. His rationibus credo non solum medicamentum facere ad cicatricē, medicamentum enim potest siccare carnem, sed non potest facere similem cuti carnem, ergo aliquid aliud requiritur præter siccationem; sed, uti medicamentum potest siccare sanguinem, ut natura faciat carnem, ita potest siccare carnem, ut fiat cicatrix à natura.

De medicamentis epuloticis.

Cap. LXXII.



QUæ autem sunt medicamenta iuvantia, ut citò faciat natura cicatricem? Sunt siccantia: & quoniam siccanda est caro, non solum ab humiditate extranea, sed propria insita, ideo requiritur, ut medicamenta sint valdè siccantia: aliud requiritur, quoniam si flueret sanguis copiosus ad locum, gigneretur caro: ideo oportet ut medicamenta habeant vim astringentem, ne fluat sanguis. Gradus adstrictionis debet esse validus, ut lingua & palato sentiat. Gradus autem siccitatis sit usque ad tertium intensum: itaque maxima siccitas in hoc medicamēto erit ad tertium: sed non omnibus corporibus competit. Pro mollioribus sit in secundo gradu: unde valida medicamenta agglutinatoria, quæ sunt sicca in secundo gradu sunt levia epulotica: illa autem quæ sunt sicca in tertio cum ad strictione sunt epulotica in corporibus siccioribus. Notate tamen unum, ut ista adstringentia vel siccantia exuta sint à mordacitate, ut non absument carnem: & ita si sunt acria, vel erunt vrēda vel ablucenda, vel ponenda in quantitate minima: & quamvis dixerim duos esse gradus, nos tamen solemus distinguere in tres classes, uti distinximus sarcotica. Primus igitur ordo epuloticorum constat simplicibus medicamētis, & est aloes, cortex thuris, cortex pini, cyperi radix cadmia optimè lota, quæ tutia Alexandrina in officinis dicitur: plumbum vstum, & lotum, cinis ostrearum lotus; ista primum habent locum in mollibus corporibus: in secundo gradu & genere sunt galle immaturæ, malicorium, flores granatorum sylvestrium, id est balauſtia, citini, sumach, mirobalani citrini, myrtilli, sanguis draconis in la chryma, & rubrica ipsa vel sinopica, vel fabrilis. Sinopicā appellamus bolum Orientalem, fabrilē bolum armenicū, terra sigillata. In tertio gradu habemus etiam vstum præparatum, squamam æris præparatam, mysi, fori, calcitum, alumen scissile, & similia, quæ sunt potentissimæ in

in quibus notate contradictionem Gal. & Aetij; dicit. n. Aet. q. mysi, & calcitis, & alumen sunt potentia epulotica, æs aut vltum est potentius, squama potentissima: itaq; in hoc tertio gradu tres species habemus. Gal. aut dicit, Potens est squama, potentius æsvltum, vltimò potentissima sunt mysi, calcitis & squama. Non potui videre codicem Græcū Aetij; quoniam non est impressus in secunda parte. Si ita se habet Græcus vt Latinus; nisi referamus de vehementia medicamenti alterum, & alterum de præstantia inducendæ cicatricis, non solui posset, ita vt Gal. de vehementia intellexerit, quia illa tria vltima validissimè excedūt, non de valore inducendæ cicatricis. Interpretor locū Aetij de præstantia inducendæ cicatricis; quoniā calcitis non est ita oportunum medicamentum: si enim medicus fallat, exedet & erodet: præstantissima est squama æris; quia, licet Medicus fallat, non exedet, inducetque cicatricem. Habemus cōposita in officinis trium generum; pro mollissimis vng. de minio, ceratum de minio, diapnonpholig. oribalsij, de quo Aetius ibidem: vng. de tutia magistrale, quod pulcherrimum est. Compositio talis sit, Recip. ol. ros. & onphacini ana vnc. vj. olei mirtini, vng. popul. ana vnc. iij. foliorum plantag. solani hortensis ana man. ij. inciduntur herbæ virentes minutim & miscentur prædictis per spatium octo dierum, & continuo agitur mixtio, vt folia macerentur: colatur, & exprimitur. postea olea expressa ponuntur ad ignem: additur ceræ albæ vnc. iij. postea auferitur medicamentum ab igne; & quum incipit tepescere addimus lithar. aurei vnc. vj. tutiæ Alex. præpar. drag. ij. ceruss. vnc. ij. plumbi rubei vsti drag. vj. camphoræ drag. j. Hæc simul miscentur, & collocantur in mortario plumbeo, & diducuntur per duas horas. Vltimi generis composita sunt, ceratum de bolo armena, vng. de tutia magistrale addita squama æris, vel ære vsto: vt singula vncia vnguenti habeat semidrachmam æris. Præterea legite Aetium, apud quem infinita epulotica reperietis. Apud Paulum lib. 4. cap. 45. habetis pulueres infinitos, & composita magna: ego vtor pulueribus, vt est squama sicca æris bene lota, squama ferri optimè emollita: vtor minima quantitate præcipitati, & præstantissima est materia: soleo etiā componere. Vltimò ablutionibus soleo tentare: & ideo accipio simplicia dicta, & coquo in vino austero; & si volo robustius in acerbis, & madefacio, & accipio spongiolam, vel abluam cicatricem huiusmodi decocto.

Lib. 14. c. 37.

3. meth. 5.

15. cap. 36.

4. lib. cap. 39
& 39.

De symptomatibus vulneribus superuenientibus, & primùm de animi defectu. Cap. LXXIII.



Inter proposita capita in sanandis vulneribus sextum erat de symptomatibus superuenientibus. Primum autem est conuulsio neruorum ex punctura, vel incisione. Secundum resolutio, ita vt paralysis adueniat. Tertium est defectus animi, quod frequens est & graue, & molestum. Quartò est febris. Quintò est liuor, durities, atque ariditas vulnerum, quæ cruditatis nomine continentur: dolor adiungitur, qui intollerabilis suboritur: solent etiam partes inflàmationes & erysipeleta, gangrenas & œdemata pati: addatis malam carnem concretam. Vltimò quæcunque mala intemperies solet prouenire, aut humida, aut calida, aut frigida vulnerebus superuenit. De spasmo, conuulsione, & paralyti non loquor: erit enim locus opportunissimus in libr. Hippocratis, de Vulneribus. Loquamur de animi defectu, qui lypotimia à Gal. vel eclipsis vocatur. Vocatur etiam lypopsichia hoc est defectus animi 12. meth. cap. 5. est autem defectus animi spirituum animalium resolutio momentanea, uel corruptio in propria substantia ab habitu quodam uenenofo, cum corrumpantur, dissipanturque spiritus, ad quam succedit cōcentratio caloris ad quam concentrationem sensus exteriores nihil ferre agant, quæ solet superuenire pluribus de causis, ut habemus ex Gal. locis dictis & primùm ex mœnore, & tristitia animi quoties vulneratus non vulnerauit vulnerantem, & conspiciat vulnus suum magnum: secunda causa est ex maxima fluxione sanguinis, qua resoluntur spiritus. tertia ex resolutione facta spirituum in dimicatione: nam, inquit Gal. quòd qui pugnant ita incalescunt, & fatigantur, ita concitantur in iram, ut cadant. quartò superuenit defectus ex venenata qualitate impressa vulnere: sæpe uidebitis in uenenatis sagittis accidere defectum animi. Vltimò, dolore superueniente dissipantur spiritus, & à dissipatione illa succedit defectus animi. Probus Medicus debet habere hæc duo, uel ut impediatur ne defectus ueniat, uel si uenerit, ut propellat, nam hic defectus ita labefactat uires, ut multa impedimēta afferat ad sauanda vulnera. Quomodo faciet? primò ut semper secunda facie pronuntietis nullum esse morbum: multi faciunt morbos maioris quàm sint momenti, & malè faciunt: semper ergo debet propalare morbum nullius esse momenti. Ego uidi exemplum in quodam his diebus cum dixerim uulnerato ægro

aduer

ad Glauc.
cap. 14.

aduersarii vulnus esse minimum, concidit animo statim: aggrauat ergo vulnus aduersarii, & dicite non esse periculum mortis, nam sæpenuerò timent sibi à prætoribus; & magistratibus: dicite ergo magna vulnera, sed non lethalia. Secundò si aduocamini magno uulnere, debetis comprimere uulnus, non sinere, ut egrediatur sanguis imponendo manum, tangatis pulsum, interrogetis an multum sanguinis exierit: si uidetis bonum colorem, facite ut fluat sanguis: tertio obseruandum, ut interrogetis an vulneratus defatigatus sit in pugnando, nam si consuetis, & deligabitis expectate deliquium animi: si ergo eius uires dissolutas uidebitis primùm suppresso sanguine curabitis, ut habeat uino infusum panem, & bibat: præterea est morbus malus, ut in sectione uenæ sedeat æger: facite, ut semper decumbat nam secus deficiet animus: impossibile est, ut dum uidet æger propria vulnera, non deficiat animo: semper iubete ut nunquam rectus uel sedens maneat. Quartò, si dubitatis de infecta sagitta, statim tētate succionem ueneni; & mandate, ut accipiant salem, rutam, & caricam & comedat, uel salem cum pane, uel rutam per se, & caricam, deinde bibat ciathum uini, ac apponat oleum ori, & abluat, post surgat uenenosam qualitatem, & hic sit minister: uel facite ut imponatur cucurbita, sed hoc dicam postea. Quintò, si uidetis dolorem magnum recurreretis ad illa imponenda, quæ faciunt ad sedationem doloris quæ iamiam dicam. Sed, si deliquium animi succedit excitate sensus exteriores, à uiolento, & robustissimo obiecto hoc fiet: & sunt uehementissima calida, & frigida, compressiones, deligationes, puncturæ, ustiones, & cætera, quæ faciunt dolorem absque solutione continui: sed aduertamus ne sint uiolenta hæc, & addamus morbum morbo. Vfus communis est aquæ, quoniam est obiectum dolorificum tunc temporis, & ita excitat sensus exteriores. Galenus ligabat, & imponebat uincula: ligantur extremi digiti. Sed nota, si vulnera sint, in partibus inferioribus ligemus partes superiores, & econtrà: quoniam non solum oportet excitare ægrum. Sed non facere attractionem ad partem vulneratam. Secundò, quoniam in deliquio concentrato calore sit magnus feruor circa thoracem, oportet, ut arteriæ capiant aerem, ideo necesse est, ut sint in aere frigidiori, ut sint dissoluti, & aperiendi thoraces, & uestes, ut copiosus aer attrahatur per pulmoues, & refrigeret spiritus concentratos. Præterea iuuantur per restitutionem spirituum, & hoc ab odoratis. Accipimus odorata; quæ potius sint frigida, quàm calida, & misceatur acetum, ut facilius penetrent ad cerebrum, hoc faciendum in deliquio animi ue-

neno frequentius. Sed, si vulneratur caput, statim eructat ab ore :
 quum hoc est, erit deliquium animi, cuius causa uenterculus est ;
 quia prauis onustus est humoribus, tunc temporis accipimus pen-
 nam, & imbuiamus aceto, & ori imponimus, ut excitemus uomi-
 tum. De febre remitto uos ad Practicos ordinarios. Sed dico unum
 chirurgicum: sæpe enim cruda sunt vulnera. Vos cognoscetis coctū
 ubi adsit candidum, & bonum pus, sin contrā reperietis liuorem, ni-
 gredinem, ariditatem, ut nulla sit humiditas, & duritiem, erit vul-
 nus crudum: aut, quia in corpore vulnerante fuerit uis contundens,
 ut partes sint contusæ, totum contusum est crudum priuatum animas:
 aut crudefcūt frigiditate ambientis, aut ratione impositi medicamē-
 ti aquæ frigidæ, boli arm. &c. Tertiò crudefcunt ob nimiam compres-
 sionem: solent ita arctè stringere, ut repellant calorem naturalem,
 & sic crudefcunt partes. Quū est hoc confugimus ad Hipp. in lib. de
 Vlc. qui proponit medicamenta concoquentia. Primum locum ha-
 bet digestium commune, quod constat ex tereb. oui luteo & ol. ros.
 uel ex ol. amigd. dulcium admixto tereb. & uitello oui. uel, si uolu-
 mus calidum, oleo camomillino admixto tereb. & ol. ros. uel cum
 butyro, & uitello oui, uel cum oleo communi, & cera: uel tetraphar-
 maco Pauli uocato: quod describitur à Paulo lib. 7. & à Celso lib. 5.
 sed admiscete partē olei amigd. dulciū: sed si quærimus cōcoctionē,
 oportet facere crassa emplastra. Materia istorū est maluarū folia, al-
 teæ, & maluarū radices: farina triticea, uel medulla panis, & similia
 generāt pus: ex istis, & oleo, & axungia cōficiemus cataplasmata. Sed
 nota, q̃ non debemus replere vulnera his cataplasmatibus; quoniā
 impediunt effluxionem saniei: imponite suprà: explete uulnus lina-
 mentis, uel siccis, uel dictis medicamentis, & circum circa imponite
 hæc emplastra: sed si uultis, imponite emplastrum officinarum dia-
 chilon dictum simplex. Diachilonon magnum, quæ cerota apud of-
 ficinas dicuntur. Addite diachilon cum gummis: & ita
 procedetis donec uidebitis quòd vulnus inci-
 pit esse rubrum: dum hoc uidebi-
 tis, recurretis ad sarco-
 tica medica-
 men-
 ta, & generantia car-
 nem.

De dolore mitigando in vulneribus. Cap. LXXIIII.



Nter symptomata, quæ solent vulneribus superuenire præcipuus est dolor: quoniam deliquii, inflammationis, & erysip. est causa: uigilias & incommoda magna inducit, quare, quum superuenit, uidentum est, qua causa ueniat: dolor autem fit ab intemperie excedente, aut solutione continui, aut ocula uenenosa qualitate, aut à corpore infixio præter naturam. Videndum igitur qua de causa fiat dolor, & si ob nimiam caliditatem, uel frigiditatem fit, tunc per qualitates oppositas curabitis. Si frigiditas sit fovebitis decocto dulcis uini, in quo decocta sint semina anisi, &c. uel oleo liliorum alb. uel oleo camom. uel oleo anetino calefacto per spongiam. Si sit intemperies calida, decoctis frigidis fovebitis aut ex rosa, aut ex nenuf. uel ex uiolis madefaciendo linteolos, uel aqua solani, uel uiolarum, &c. Si autem fiat ratione futurarum eò qd futuræ comprimentes soluantes continuum excitent dolorem, sunt auferendæ, & tunc linteo duplicato, & calefacto debetis fouere uulnus: nam isto modo statim cessat dolor: si autem fuerit extranea substantia: exempli gratia spiculum, uel spina, extractioni incumbite, & docebo in inferioribus: docui etiam instrumenta: uel imponite medicamentâ dicta extrahendi uim habentia: si autem uenenum adsit, extrahatur, uel suctu, uel cucurbitula, & de hoc tractaui anno superiori. Si uerò esset aliquod quod faciat solutionem continui, uerbi gratia materia, sanguis fluens, &c. debemus secare uenam statim; quia materiæ fluxus est causa doloris, si autem est quid prohibens sectionem uenæ, exhibebimus pharmacū eius generis, cuius est humor. Præterea fovebimus oleo ros. omphac. in quo cocti sint lumbrici terrestres; quia hoc facit ad dolorē, & fouendum locum: si autem non detinetur sanguis, & dolor deueniemus ad frigida, ad oleum nenuf. papauer. Et poterimus oppii parum addere, addendo musci parum ad leniendam frigiditatem oppii, & ut penetret facilius. Sunt alii qui accipiunt folia hiosciam albi, folia uiridia solani hortensis & obuoluunt simul, & faciunt fasciculum, & coquunt sub prunis, postea contundunt, & faciunt emplastrum, & imponunt vulneribus; uel accipiunt panem, lac, & oleum ros. & folia dicta, & faciunt emplastrum, & hæc superant omnia dicta ad leniendum dolorem. Sedato dolore deueniemus ad dicta medicamenta.

De inflammatione. Cap. LXXV.



QUum inflammatio succedit, debemus impedire materiã secta vena, & pharmaco emplastro ex lacte, pane, farina hordei, aqua & oleo ros. hoc præstantissimum est, repellit, lenit, contemperat, & omnia facit, quæ necessaria sunt. Si autem non satis est hoc, potestis vii cum Hipp. lenticula palustri, quam cum vino coquatis, & addite rosaceum: præterea accipite auriculam muris vulgo paparina, loco lenticulæ: vel accipiat folia rubi canini, & coquatis: præterea admiscete lenticulam; & ita cum ros. conficietis empl. præterea folia verbasci sylvestris contusa cruda imponetis: præterea folia trifolij, maluarum, altheæque simul commixta cruda ponatis. Vel recurratis ad ea, quæ explicata sunt anno superiori à me, c. de inflammat.

De erisipellate. Cap. LXXVI.



QUum succedit erisipelas, imponite hoc medicamentum vulnere, Recip. tercb. decies ablutam aqua solani, admiscebitis farinam hordei, & luteum oui, & habebitis medicamentum refrigerans. Si vultis, vt magis refrigeret, loco aquæ solani abluite aqua papaueris, vel lactucæ. Circa partes circumpositas vngentis oleo nenufarino loto. Antequam sit oleum nenuf. abluatur oleum, sed, si non habetis, abluite factum, vel oleo violaceo abluto. Quomodo abluetis? Accipite vnâ partem oliorum, & duplum aquæ lactucæ, aut solani, & ponatis in siala, quam per horam contundetis & obvoluctis, oleum spissatur, & sic penna illinietis partes, postea imponetis folia nenufarii vel solani, vel lactucæ: vel poteritis recipere aquas solani, foliorum papau. violarum, lactucæ, & his madefacere linteola. Noster Hipp. solebat imponere medicamentum, quod discuteret, & refrigeraret: & accipiebat farinam sem. lini cum aqua solani. Accipietis etiã folia solani, glastri, folia plantag. ex quibus emplastrum fit, & imponitur. Soleo ego accipere farinam hordei, medullam panis, folia maluarum, solani, & oleum ros. & aquã, & paro empl. & vtor felicissimè.

De mado ab
luendi oleo.

De intemperiebus. Cap. LXXVII.



I autem adsit intemperies calida, quæ impediatur sanitatem vulneris: ea erumpi imponenda quæ dixi in erisipelate. Si intemperies frigida, hismet utimini, quibus in dolore, sedando. vel fufum Nicolai, vel vng. de matrisylua in tota parte dissolutum cum oleo laurino, vel cum oleo de castoreo: istis oleis tantum oleo lirino com. oleo lil. alb. compl. vel oleo de castoreo. Si erit intemperies sicca fouete hydrelæ: accipite aquam & oleum dulcissimum ex oliuis, vel amygdalarum dulcium, calefactis, & linteo madefacto fouete, vel supra ollam conseruetur pars seruata, in qua bulliat hoc oleum.

De ædema & sanguinis fluxu.

Cap. LXXVIII.



Et si superuenerit cedema, madefacite spongas nouas, quæ sapiant salsuginem, & madefacite in posca oxierato appellata. Si autem nimius fuerit fluxus sanguinis: hoc symptoma cruciat Medicos, & si Medicus non suppressit sanguinem aut grumus crescit, aut vita perditur: sed quia hic solet superuenire in arteriis & venis magnis incisis: ideo referuo ego dum tractabo de vulneribus arteriarum, & venarum, quæ insignes sunt: ibidem ergo ad plenum tractabo.

Epilogus omnium hactenus dictorum.

Cap. LXXIX.



Nunc ergo patet quid sit solutio cõtinui, & species eius, & vulnus esse inter illas: quid sit vulnus, à quibus fiet, & quid præfagiendum à quolibet vulnere. Postea habemus curationem simplicis vulneris, & etiam cum symptomatibus. Sed cum hæc communiora sint à nobis dicta, ideo restat de particularibus tractare. Et quia Maiores nostri semper à superioribus incipere solent, ideo

idco de vulneribus capitis, oculorum, nuca & cæterorum solent initium sumere tractationis: & quia Hippoc. fecit aureum
Tractatum de Vulneribus capitis, ideo ergo primum de iis agam, &
interpreta-
bor ea.

*Gabrielis Falloppij Tractatus
de Vulneribus,
FINIS.*



